

Ueber Fehldiagnosen
bei encephalitischem
Parkinsonismus.



INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung der Doktorwürde, vorgelegt der
hohen medizinischen Fakultät der Westfälischen
Wilhelms-Universität zu Münster in Westfalen

von

ERNST WIENOLD

aus Gelfenkirchen.

1 * 9 * 2 * 8

Gedruckt in der Werkdruckerei Chr. Janzon in Gelfenkirchen

Dekan: Professor Dr. Coenen
Referent: Professor Dr. Kehrer



Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (Westf.)

Ueber Fehldiagnosen bei encephalitischem Parkinsonismus.

Fehldiagnosen sind gewiß nichts Seltenes. Auch dem Erfahrensten werden sie selbst auf seinem ureigensten Spezialgebiet hin und wieder bei aller Sorgfalt unterlaufen. Trotz allen uns durch die moderne Forschung neu vermittelten Kenntnissen ist unser Wissen über das physiologische und pathologische Geschehen auf vielen Gebieten eben noch recht lückenhaft, und nur derjenige, der nicht in der Lage ist, all die Schwierigkeiten, die sich der Diagnosefindung trotz aller durch die fortgeschrittene Technik neu geschaffenen diagnostischen Hilfsmitteln entgegenstellen, wird sich über Fehldiagnosen verwundern. Es sei dabei ganz abgesehen von Fehldiagnosen, die auf mangelhaftem, medizinischem Wissen und Können beruhen, oder die bedingt sind, durch Schwierigkeiten, wie sie sich zum Beispiel dem überlasteten praktischen Arzt, sei es in der Großstadt oder in einer weitverzweigten Landpraxis infolge äußerer ungünstiger Verhältnisse bei der Untersuchung entgegenstellen.

Beachtenswert werden jedoch meines Erachtens solche Fehldiagnosen, bei denen es sich immer wieder um Verknennung ein und desselben bestimmten Krankheitsbildes handelt und insbesondere dann, wenn es sich dabei nicht um die Diagnose irgendeines einzelnen Arztes auf Grund einer einmaligen, vielleicht oberflächlichen Untersuchung handelt, sondern wenn es Fälle betrifft, die von einer ganzen Reihe von Aerzten, unter anderem darunter auch von Fachärzten, unabhängig von einander und häufig eine längere Zeit hindurch beobachtet und untersucht und trotzdem verkannt worden sind. Etwas derartiges trifft offenbar zu bei den chronischen Zustandsbildern der epidemischen Encephalitis.

In seiner Abhandlung „Dienstbeschädigungs-Frage und epidemische Encephalitis“ führt Felix Stern aus, daß es von klinischem Interesse sei, daß die epidemische Encephalitis größtenteils, sei es im Anfang, sei es selbst im weiteren Verlauf diagnostisch völlig verkannt und teils als Hysterie, teils als Katatonie, aber auch als multiple Sklerose, Neurose nach Malaria, Meningitis, Bulbärparalyse diagnostiziert worden war. Von 26 Fällen, in denen in diesem Fall die Dienstbeschädigungsfrage zur Erörterung stand, sei eine solche Fehldiagnose in nicht weniger als 15 Fällen gestellt worden, meist nicht nur im Anfang, sondern zum Teil selbst von Fachärzten, bis die Kranken zur klinischen Beobachtung kamen. Bei der Bedeutung der Diagnose bzw. der Fehldiagnose für die Behandlung und die Beurteilung einer Krankheit dürfte eine Zusammenstellung bzw. erneute Veröffentlichung einschlägiger Beobachtungen über derartige Fehldiagnosen vielleicht also wohl eine gewisse Berechtigung haben.

Für die vorliegende Arbeit sind mir eine Reihe von Fällen von Herrn Professor Dr. Kehrner, Münster aus eigenem Material zuvorkommender Weise zur Verfügung gestellt worden. Einige weitere Fälle sind mir in meiner Tätigkeit als Versorgungsarzt bekannt geworden. Zunächst möchte ich jedoch kurz zwei hierher gehörende Fälle erwähnen, die Felix Stern unter anderem in seiner oben erwähnten Abhandlung aus der Göttinger Klinik mitteilt.

Fall 1:

S., gesunder Mensch ohne neurotische Antecedentien. Im Jahre 1917 im Priesterwald an Fieber, Schlassucht, Ptosis, Doppelsehen erkrankt. Keine Erholung von der Erkrankung. Während die akuten Erscheinungen zurückgingen, blieb eine allgemeine Kränklichkeit zurück, der sich allmählich Zittern und Steifigkeit anschloß. Acht Gutachter, darunter Fachärzte, nahmen hysterisches Zittern an, bis S. im Jahre 1923 zur Beobachtung in die Göttinger Klinik kommt. Hier zeigt sich typischer Parkinsonismus mit Aspontanität, Rigidität, Ruheszittern, Salbengesicht, Bradyphrenie.

Fall 2:

F., 1888 geboren, Lokomotivheizer. Nach der Anamnese konstitutioneller Psychopath. Ein Bruder hat Selbstmord begangen, eine Schwester ist an Veitstanz gestorben. Hat

selbst angeblich in der Lehrzeit schon Schwindelanfälle bekommen. Im Anschluß an eine „Verschüttung“ im Felde bestand vorübergehend Sprachlähmung und andere, wahrscheinlich rein psychogene Störungen. Im April 1920 wird Antrag auf Verlosgung gestellt mit der Behauptung, sich im Felde durch Anstrengungen und Aufregungen eine Nerven-schwäche zugezogen zu haben. F. wird dann von den verschiedensten Aerzten, dabei mehrfach von Fachärzten, untersucht. Aus der Anamnese ergibt sich außer dem bereits erwähnten, daß F. nach der Entlassung aus dem Heeresdienst im Februar 1919 an Hinterkopfschmerzen akut erkrankte, zunächst weiter arbeitete, dann aber, angeblich nach einer Aufregung an hohem Fieber mit Delirien und vorübergehenden Sehstörungen litt. Dann sah F. alles verschwommen und doppelt. Im Anschluß hieran blieb eine starke Unruhe im ganzen Körper mit starkem Mattigkeitsgefühl und Speichelfluß zurück. Von einem Nervenarzt wurde er mit Elektrisieren behandelt. Bei einer ärztlichen Untersuchung im Jahre 1919 zeigte F. bereits maskenhaften Gesichtsausdruck, eigentümlich steife Körperhaltung, vorsichtige Bewegungen, zeitweiligen Speichelfluß, tickartige Zuckungen und Vibrieren der Oberlippe. Die Diagnose wird auf Hysterie gestellt. Erwerbsminderung unter 10 vom Hundert. Am 1. Mai 1920 wird F. mit der Diagnose Hysterie in ein Lazarett aufgenommen. Er klagte über Doppelbilder und Aufgeregtheit und zeigte bei der Untersuchung zeitweiliges Zucken der Oberlippe. Ein Gutachten vom 30. September 1920 führt wieder aus, daß F. an hysterischen Krankheitserscheinung leide, die durch die Strapazen und Anstrengungen des Krieges ungünstig beeinflusst seien. Die Erwerbsminderung wird auf 20 vom Hundert geschätzt. Im Oktober 1920 wird die Diagnose auf angeborene Unterwertigkeit der Nerven (Psychopathie) und Nervenerschöpfung gestellt. Im Juli 1921 stellt ein Nervenarzt ständigen Speichelfluß, Schielstellung der Augen, sehr geringe Pupillenreaktion, feinschlägiges Zittern des rechten Armes, Steifhaltung der rechten Hand und der rechten Finger fest. Er stellt danach die Diagnose auf constitutionelle Psychopathie und empfiehlt eine energische Behandlung in einer geschlossenen Anstalt. Erst am 21. September 1921 stellt ein anderer Nervenarzt die Diagnose auf eine organische Gehirnerkrankung, und erst von einem dritten Nervenarzt wird dann die richtige Diagnose Encephalitis Ende September 1921 gestellt. Es bestanden damals ganz typische Erscheinungen, wie nach vorn geneigte Körperhaltung, Beuge-

stellung der Arme, Pupillenträgheit, starke Rigidität der Hals- und Rückenmuskulatur, dauernde myoklonische Zuckungen der Oberlippenmuskulatur, starrer Gesichtsausdruck, dauernder Speichelfluß, Strabismus infolge von Augenmuskel-Lähmungen, Bradykinese usw.

Die nun folgenden zwei weiteren Fälle kamen in der Münsterischen Nervenklinik zur Beobachtung.

Fall 3:

B. W., 1892 geboren, Händler, wurde 1916 durch Granatsplitter am rechten Oberarm und der rechten Hand verwundet. Der Arm mußte in der Folgezeit abgesetzt werden. Es wurde ihm deswegen eine Rente von 70 vom Hundert zugewilligt. Zur Vorgeschichte wurde auf Befragen ferner angegeben, daß er eigentlich nie ernstlich krank gewesen sei, nur habe er im Winter 1915/16 im Felde an einer Grippe gelitten, er habe 14 Tage im Revier mit Fieber, Kopfschmerzen, Mattigkeit und Schnupfen krank gelegen. In den letzten Jahren sei er auch öfter erkältet gewesen. Es sei aber niemals besonders schlimm gewesen und er habe nie zu Bett gelegen. Kann auch über diese Erkältungen keine näheren Angaben mehr machen. Nach dem Kriege war er zunächst in der Landwirtschaft tätig. Da er aber mit dem einen Arm sich hier nur schlecht helfen konnte, fing er einen Eier- und Butterhandel an. Zuerst habe es ganz gut gegangen. Seit $1\frac{1}{2}$ Jahren gehe es ihm aber immer schlechter und er könne jetzt garnichts mehr leisten. Er könne nämlich mit dem rechten Bein nicht mehr ordentlich gehen, auch könne er seine Kiepe nicht mehr tragen, weil die Schulter kraftlos geworden sei. Seine Bewegungen seien seit der selben Zeit immer langsamer geworden. Das Gedächtnis habe nachgelassen. Habe sich von jeher müde gefühlt, nach dem Kriege sei dies aber immer stärker geworden. Sprachveränderungen sind ihm nicht aufgefallen. Sehen und Hören ist gut geblieben. Hat niemals Doppelsehen gehabt, auch nie Speichelfluß oder besondere Trockenheit im Mund. Der Schlaf ist gut und war es auch immer. Verwirrheitszustände und Magen-Darminfektionen sollen nie bestanden haben. Im Dezember 1925 stellte er wegen der oben angegebenen Beschwerden einen Antrag auf Erhöhung der Rente.

In einem ärztlichen Attest des beamteten Arztes eines Bezirksfürsorgeverbandes ist angegeben, daß W. seit dem Jahre 1924 an einem allmählich zunehmenden Schwächegefühl in

der rechten Schulter und des ganzen rechten Beines sowie an Kältegefühl im rechten Bein gelitten habe, und daß ihm hierdurch das Gehen und das Tragen von Lasten auf der rechten Schulter sehr erschwert werde. Einen objektiven Befund, der die Beschwerden erklärte, konnte der Arzt nicht erheben, doch nahm er einen ursächlichen Zusammenhang der Beschwerden mit den Einwirkungen des Feldzuges an.

Am 19. 2. 1926 wurde W. versorgungsärztlich begutachtet. Es wurde eine hysterische Lähmung angenommen. Aus dem Befund ist hervorzuheben: „Gedrückte Stimmung. Beim Gehen wird das rechte Bein wie gelähmt nachgeschleift, im Hüft- und Fußgelenk werden aktive Bewegungen gar nicht ausgeführt, im Kniegelenk nur in geringem Maße. Auch Schulterbewegungen können angeblich nicht ausgeführt werden. Beinmuskulatur beiderseits gleich kräftig. Kniesehenreflex vorhanden, aber rechts weniger lebhaft als links. Beim Sitzen grobschlägiges Zittern des rechten Beines“.

Am 12. 3. 1926 wurde W. fachärztlich untersucht. Es wurde eine funktionelle Schwäche des rechten Beines auf hysterischer Basis angenommen. Dienstbeschädigung wurde abgelehnt. Sein Rentenanspruch wurde daraufhin abgewiesen.

Auf die dagegen eingelegte Berufung wurde W. der Münsterischen Klinik zur Begutachtung überwiesen. Hier fand sich, abgesehen von den Kriegsfolgen (Verlust des rechten Armes) und einer Schlagaderverkalkung mäßigen Grades das typische Bild des Parkinsonismus bei epidemischer Encephalitis. Die Fettabfonderung im Gesicht war erhöht, die Lidspalten waren ungleich, der Lidschlag zeitweilig selten. Der Mund wurde ungleich geöffnet und bei Bewegungen der Gesichtsmuskulatur, die besonders in der Stirn zu langsam erfolgten, zeigte sich ein feines Vibrieren. Der Gesichtsausdruck war unbelebt und müde. Die Zunge wurde nur langsam und zitternd ausgestreckt. Die Sprache war verlangsamte, zäh und matt. Die an sich lebhaften Sehnenreflexe waren am rechten Bein schwächer. Im rechten Bein bestand bei passiven Bewegungen eine Rigidität, am rechten Fuß das sogenannte paradoxe Phänomen. Die Haltung des rechten Beines bzw. Fußes war nicht die gleiche, wie die des linken. Außerdem war seine Beweglichkeit verringert und verlangsamte. Besonders zeigte sich letzteres beim Gehen. Deutlich war dabei auch die nach vorn geneigte Haltung des Oberkörpers und die Neigung, nach vorn oder hinten zu schießen, zu erkennen. Auffallend war dann noch ein gelegentlicher tiefer Atemzug,

der auf eine durch das Hirnleiden bedingte Störung des Atmungsorganismus schließen ließ. Am linken Bein bestand ein Zittern, ein gleiches auch in der Muskulatur des rechten Armstumpfes. Letzteres war anscheinend nicht die Folge der Gehirnerkrankung, da es auch sonst häufig in Amputationsstümpfen anzutreffen ist. Es bestand eine durchaus deutliche Armut an allgemeinen Bewegungen und in seelischer Beziehung eine Verlangsamung des Denkvorganges.

Im Fall 4

handelt es sich um einen 51-jährigen Kaufmann P. M. Die Familienanamnese ergibt nichts Besonderes. Ist seit 1913 verheiratet. Die Ehe blieb kinderlos. Erkrankte im 36. Lebensjahr an Scharlach und war deswegen 6 Wochen bettlägerig. Bis zum Anfang der Vierziger Jahre litt er durchschnittlich zweimal im Jahr an Halsentzündung. Ueber vorausgegangene Grippeerkrankungen werden sichere Angaben nicht gemacht. Auf genaues Befragen wird jedoch mitgeteilt, daß im Jahre 1923 8 bis 10 Tage Darmkrankheit, Durchfall und Fieber bestanden hat.

Vor ungefähr 3 Jahren machte sich bei ihm ohne jede äußere Veranlassung eine leichte Versteifung des rechten Armes bemerkbar, welche mit der Zeit immer stärker wurde und allmählich auch auf das rechte Bein überging, ohne daß dabei irgendwelche Schmerzen auftraten. Im Verlauf des letzten Jahres hat die Erschlaffung derart zugenommen, daß vollständige Arbeitsunfähigkeit eingetreten ist. Die Schreibfähigkeit ist vollständig geschwunden, der rechte Arm ist versteift und das rechte Bein muß nachgezogen werden. Schnelles Laufen und Treppensteigen fällt ihm schwerer, als langsame Gehen auf ebener Erde. Seit einiger Zeit treten auch Schmerzen im Rücken zu beiden Seiten der Hüften auf. Es besteht eine Unsicherheit in den Bewegungen und eine Neigung, nach rechts zu gehen, welche im Laufe des Tages immer stärker in die Erscheinung tritt. Vorwiegend beim Liegen tritt ein blitzartiges Saufen im Kopf und ein Riefeln, das durch den ganzen Körper läuft, auf. Im Ruhezustand macht sich ein bleischweres Gefühl in der rechten Hand bemerkbar, das sich auch zeitweise in der linken zeigt.

Schlaf und Appetit ist gut. Die bisher angestellten Untersuchungen der Augen, des Blutes und des Urins waren negativ. Die angeordneten Fichtennadel-Bäder, Massieren, Elektrifizieren und das verordnete Jod blieben wirkungslos. Die bisher konsultierten Aerzte waren über den Charakter

des Leidens verschiedener Ansicht. Ein Arzt äußerte sich dahin, daß es sich um einen außergewöhnlichen Fall handle, der aus dem Rahmen der bisherigen Krankheitserscheinungen herausgehe. Ein anderer vermutete eine Geschwulst im Kopf, die auf eine bestimmte Stelle drücke und dadurch die Hemmungen hervorrufe. Ein dritter Arzt führte die Erscheinungen auf seelische Störungen zurück. Ein vierter Arzt kam dann dem Wesen der Erkrankung nahe und bezeichnete die Erscheinungen als Folge von Veränderungen im Zellengewebe des Gehirns, welche vornehmlich nach Grippe auftreten.

Der Befund in der Kehler'schen Klinik ergab: Fettglanz im Gesicht, Dermographie, Neigung zur Hautröte. Hypertonie, und zwar im rechten Arm stärker als im linken Bein. Dorsalflexion der Zehen, rechts stärker als links. Andeutung von Tremor bei bestimmter Haltung der Finger. Neigung zu Pfötchenspreizstellung. Facialis rechts erheblich schwächer als links. Rigor, Bradypnoe. Läuft lieber, als daß er geht. Gelegentliche Mikrographie. Pseudo-Babinski: Beiderseits Tendenz der Großzehe zur Dorsalflexion, links erheblich stärker als rechts noch eher bei Mitbewegungen wie auf Bestreichen; manchmal dabei Fächerstellung der Zehen 2–5. Gelegentlich Nyctagmuseinstellungen. Die serologische Untersuchung des Liquors nach Wassermann und Sachs-Georgi fiel negativ aus.

Die Klinik stellte auf Grund des Befundes die Diagnose „epidemische Encephalitis.“

Die nun folgenden zwei Fälle lernte ich als Versorgungsarzt kennen.

Fall 5:

A. Sch., 5. 9. 74 geboren, Bürovorsteher. Vor dem Kriege angeblich nie ernstlich krank gewesen. Wurde im August 1914 zu einem Landsturm-Truppenteil nach Leitmeritz a. E. (Böhmen) eingezogen. Im Jahre 1916 litt er vorübergehend an einer Erkältung, über die näheres aus den Akten nicht zu ersehen ist. War sonst während der Garnisonsdienstzeit nicht ernstlich krank. Im März 1918 rückte er ins Feld. Im Oktober 1918 erkrankte er an der Isonzofront an Malaria. Aus den nur geringfügigen Aufzeichnungen ist außer Fieberanfällen am 22., 23. und 27. Oktober nur eine Eintragung vom 29. Oktober 1918 „Ueber beiden Lungen feuchtes Rasseln — Diagnose Bronchitis“ — vermerkt. Außerdem fand sich auf einem angeklebten Zettel der Vermerk „Tertiana

florid“ und Angaben über entsprechenden Blutbefund. Ein ordentlich geführtes Krankenblatt war nicht vorhanden. Am 20. März 1924 stellte Sch. Rentenanspruch wegen „Malaria und Nervenleiden, rechtsseitige Lähmung.“ Er führte sein Leiden auf die Malaria-Erkrankung im Oktober 1918 zurück und benannte drei Aerzte, darunter einen Internisten, bei denen er wegen seines Leidens in Behandlung gewesen sei. Auf eine Anfrage des Versorgungsamtes teilte einer dieser Aerzte unter dem 22. 5. 1924 mit, daß Sch. kurz nach dem Kriege 6 Monate bei ihm in Behandlung gewesen sei. Es habe sich damals um „nervöse Störungen“ gehandelt. Bei der versorgungsärztlichen Untersuchung im Mai 1924 klagte Sch. über Bewegungsbehinderung im rechten Arm, Schwere in der rechten Hand und zeitweiliges Benommensein im Kopf. Auf Befragen gab er als Ursache seiner Beschwerden die schlechten Ernährungsverhältnisse an der italienischen Front und die überstandene Malaria an und erklärte gleichzeitig, daß er die Schwäche im rechten Arm bereits während der Lazarettbehandlung wegen Malaria verspürt habe und deswegen nach der Entlassung aus dem Heeresdienst häufig in ärztlicher Behandlung gewesen sei. An anderer Stelle führte er dazu ergänzend noch aus, daß er schon im Lazarett nach Abklingen des Fiebers kaum habe schreiben können. Das sei aber erst der Anfang der Bewegungsstörungen in der rechten Hand gewesen, die seitdem nicht gewichen seien. Die ganzen Jahre über, in denen er in leitender Stellung gewesen sei, habe er alle seine Unterschriften nur mit einem Stempel gegeben. Will die Störung aber gegenüber dem Büro verheimlicht, und, wenn Unterschriften für Vorgesetzte zu erledigen waren, sie mit beiden Händen geschrieben haben. Im Frühjahr 1923 sei er von einem Arzt 3—4 Monate lang mit Elektrizität behandelt worden. Die Störungen im rechten Arm hätten sich seitdem noch verschlimmert und seien dann auch auf das rechte Bein übergegangen. Seine Direktion habe ihn bereits im Januar 1923 pensionieren wollen, ihm aber dann im April 1923 mit 6 Monaten Frist gekündigt. Der Antrag auf Militärversorgung sei deswegen so spät, das heißt erst im März 1924 gestellt, weil es ihm als Ausländer damals erst durch eine neue Bestimmung möglich gewesen sei.

Aus der eingehenden Befundschilderung des Versorgungsarztes ist folgendes hervorzuheben:

„Guter Kräfte- und Ernährungszustand, blasse Gesichtsfarbe, gute Schleimhautdurchblutung. Brustkorb flach. Die

rechte Schulter steht höher als die linke. Das rechte Schulterblatt steht stärker ab als das linke. Es besteht geringe Kyphoskoliose der Wirbelsäule. An den Brust- und Bauchorganen kein besonderer krankhafter Befund. Urin und Blut o. B.

Der rechte Mundwinkel bleibt zeitweilig beim Zähnezeigen etwas zurück, sonst Gesichtsmuskulinnervation symmetrisch. Pupillenspiel und Augenbewegungen frei. Sehnenreflexe am rechten Arm etwas stärker als links. Bauchdecken- und Hodenhebereflexe auszulösen, rechts-links. Knie- und Achillessehnenreflexe auszulösen, rechts-links. Bei Fußaugenschluß etwas Schwanken nach links und Lidflattern. Kein Lafègue, kein Kernig, kein Babinski, keine Cloni, keine Ataxie. Hautempfindung intakt. Lebhaftes Hautschriffröte. Muskulatur am rechten Arm und rechten Bein etwas gespannt. Bei fremdtätigen Bewegungen Widerstand. Keine Bewegungsbehinderung an sich im rechten Arm. Es können sämtliche Bewegungen ausgeführt werden. Die Bewegungen erfolgen aber nur langsam, ruckweise, unter leichtem Zittern der Arme. Ein feineres Fingerspiel oder das Ausführen von rasch wechselnden Bewegungen ist rechts nicht möglich. Bewegungen im rechten Bein erfolgen langsam. Fußheben rechts ist nur bis 80 Grad, Senken bis 110 Grad möglich. Fremdtätig keine Bewegungsbehinderung im Fußgelenk. Zehenbewegungen rechts erfolgen nur in ganz geringem Maße. Bei dem Vergleich der Umfangsmaße findet sich ein Minderumfang von durchschnittlich $1\frac{1}{2}$ cm zu Ungunsten des rechten Beines. Beim Gehen wird der rechte Arm im Ellenbogengelenk leicht gebeugt gehalten, die Finger in den Grundgelenken etwas gebeugt, im übrigen gestreckt. Auftreten mit dem rechten Bein erfolgt etwas stampfend. Bleibt zeitweise mit der rechten Fußspitze hängen“.

Wie aus der wörtlich wiedergegebenen Befundschilderung — fortgelassen habe ich nur die im Versorgungszeugnis eingehendere Beschreibung des Befundes an den Organen der Brust- und Bauchhöhle — hervorgeht, bestand bei der Befundaufnahme bereits ein fast klassisches Bild des Parkinsonismus. Der Versorgungsarzt stellt jedoch die Diagnose „Bewegungsbehinderung im rechten Arm und rechten Bein, wahrscheinlich als Folge einer im Anschluß an Malaria aufgetretenen Neuritis“, nimmt dafür Dienstbeschädigung an und schätzt die Erwerbsminderung auf 50 vom Hundert. Der das Zeugnis prüfende Arzt beim zuständigen Hauptverorgungs-

amt setzt unter dasselbe den Prüfungsvermerk „Einverstanden“. Es erfolgt darauf entsprechende Bescheiderteilung.

Am 3. 7. 1924 wird eine erneute verforgungsärztliche Untersuchung vorgenommen wegen eines Badekurantrages. Der dabei erhobene Befund ist im wesentlichen derselbe wie eben geschildert. Es wird insbesondere wieder auf einen starken Spannungswiderstand in der Muskulatur des rechten Armes und des rechten Beines bei fremdtätigen Bewegungen hingewiesen. Bei den selbsttätigen Bewegungen bestehe fibrilläres Muskelzucken. Die Bewegungen im rechten Arm erfolgten langsam. Der Arm werde im Ellenbogengelenk gebeugt gehalten.

Das Gutachten lautet darauf wieder: „Es handelt sich um neuritische Erscheinungen. Durch eine Badekur werden dieselben voraussichtlich günstig beeinflusst“.

Daraufhin wird eine vierwöchentliche Badekur bewilligt. Im „Abschlußgutachten nach beendeter Kur“ führt der ärztliche Leiter der Kuranstalt am 22. 8. 24 aus, daß sich das Allgemeinbefinden gebessert habe. Das Zittern im Arm, der stets gebeugt gehalten werde, bestehe jedoch unverändert fort. Die Gebrauchsfähigkeit der rechten Hand sei sehr gering. Im übrigen Befund (Kopfhaltung und Gang) sei keine Besserung erzielt worden. Der Arzt läßt die Krankheitsbezeichnung unverändert bestehen bzw. äußert sich zu der bestehenden Diagnose überhaupt nicht weiter und schätzt die Erwerbsminderung auf 50 vom Hundert.

Sch. hat inzwischen gegen die Festsetzung der Erwerbsminderung auf 50 vom Hundert Berufung eingelegt. Er legt ein Zeugnis eines Nervenfacharztes vom 5. 7. 24 vor, das ihn wegen „Nervenleidens“ für völlig erwerbsunfähig erklärt. Ueber die Art des „Nervenleidens“ spricht sich jedoch dieser Nervenarzt in seinem Gutachten nicht aus. Während des Berufungsverfahrens erfolgt dann am 30. 4. 25 eine nochmalige nervenfachärztliche Begutachtung. Jetzt wird endlich die richtige Diagnose „Parkinsonismus als Folge von epidemischer Gehirnentzündung“ gestellt. Es fand sich damals eine typische Parkinsonhaltung, Bewegungsarmut, starres maskenartiges Gesicht, feinschlägiges Zittern der rechten Hand, Rigidität in der rechten Arm- und Beinmuskulatur, Adiadochokinesie usw.

Bei dem nun folgenden

Fall 6

ist das Krankheitsbild ebenfalls Jahre lang verkannt worden,

doch ist es mir nicht wie im vorhergehenden Fall möglich, die ärztlichen Fehldiagnosen an Hand von Attesten zu verfolgen. Daß das Leiden aber Jahre lang verkannt worden ist, geht aus der folgenden Schilderung ebenfalls hervor.

H. K., geboren am 24. 11. 96, Schneider, stellt unter dem 12. 5. 27 Antrag auf Anerkennung von D. B. für ein Nervenleiden und Gewährung entsprechender Rente. Er führt die Entstehung seines Leidens auf mehrere schwere Stürze vom Fahrrad, die er während des Kriegsdienstes als Kompagnieordonnanz erlitten habe, und auf den anstrengenden Dienst im allgemeinen zurück. Das Leiden habe sich erstmalig gezeigt im Mai oder Juli 1919. Es habe damals Schüttelfrost bei ihm bestanden. Der ihn damals behandelnde Arzt habe ein Nervenleiden bei ihm festgestellt. Er habe ihm gesagt, er könne ihm nicht helfen, das Leiden müsse die Zeit ausheilen. Er habe damals etwa 14 Tage krank gefeiert. Nach dieser Zeit habe das Kopfschütteln etwas nachgelassen. Er habe dann Arbeit bei der Eisenbahn aufgenommen. Bis 1924 habe er nicht mehr krank gefeiert. Seit 1924 habe sich das Leiden immer mehr und mehr verschlimmert, sodaß er jetzt zu keiner Arbeit mehr imstande sei. Er sei bei verschiedenen Aerzten in Behandlung gewesen. Keiner habe ihm jedoch helfen können, und bisher habe ihm auch noch niemand gesagt, an welcher Krankheit er denn eigentlich leide. Die Aerzte hätten immer nur von einem Nervenleiden gesprochen.

Aus den Akten ist über das Vorliegen einer Erkrankung während des Kriegsdienstes nichts zu ersehen. Die Krankenkassenauskünfte berichten über die Zeit nach dem Kriege nur von einer Krankfeierzeit wegen einer Zerrung der Brust- und Halsmuskeln und einer Wunde an der Stirn im Februar 1920.

Unter dem 27. 8. 1927 bescheinigt ein praktischer Arzt, daß K. über körperliche Schwäche, Zittern der Arme, besonders des rechten und Zuckungen in der Gesichtsmuskulatur klage. Den Befund schildert er wie folgt:

„K. befindet sich in schlechtem Ernährungszustand. Herz, Lungen und Verdauungsorgane sind ohne krankhaften Befund. — Nervenystem: Schwanken bei Fußaugenschluß, starker Tremor der gespreizten Finger, erhöhte Patellarreflexe. Hornhaut- und Rachenreflexe abgeschwächt. Sensibilität gegen spitz und stumpf ungestört“. — Der Arzt führt dann weiter aus, daß er K. seit etwa 2 Jahren kenne und den Eindruck habe, daß sich das „Nervenleiden“ in der letzten Zeit verschlimmert habe. Auf die Art des Nervenleidens geht er mit keinem Wort ein.

Bei der etwa 4 Wochen später am 24. 9. 1927 durch einen Verforgungsarzt vorgenommenen amtsärztlichen Untersuchung findet dieser vornübergebeugte Haltung mit leicht vorgenommenen Schultern und vorgeneigtem Kopf. Der rechte Arm hängt schlaff herab und wird beim Gehen nicht bewegt. Zeitweise geringes Zittern in der rechten Hand, das aber aufhört, sobald man die rechte Hand anfaßt. Die Armmuskulatur ist rechts um 1 cm schwächer als links, trotzdem K. Rechtshänder ist. Bei fremdtätigen Bewegungen spürt man im rechten Arm eine gewisse wenn auch nicht erhebliche Rigidität. Eine ausgesprochene Rigidität findet man bei fremdtätigen Bewegungen im rechten Handgelenk und in den Fingergelenken. Ebenfalls besteht im rechten Bein eine mäßige Rigidität. Das Gesicht ist maskenartig, ausdruckslos. Zeitweise besteht in der linken Gesichtsmuskulatur ein geringes Zittern. Die Sprache ist leise, monoton. Die Stimmung ist gedrückt. Größere Intelligenzdefekte sind nicht nachzuweisen. — Nerven-system: Pupillen rund, gleich weit, reagieren prompt. Keine Augenmuskellähmungen, kein Augenzittern. Der linke Mundwinkel hängt ein wenig herab und wird beim Zähne-zeigen und Mundspitzen nicht ganz mitgenommen. Die gerade herausgestreckte Zunge flimmert etwas. Knie- und Achillessehnenreflexe gesteigert, rechts-links. Kein Oppenheim, kein Babinski, kein Romberg, keine Cloni, keine Ataxie. Angedeutete Adiadochokineses.

Der Verforgungsarzt spricht nach der Befundschilderung die Ansicht aus, daß es sich nach dem Ergebnis der Untersuchung wahrscheinlich um einen Parkinsonismus handle. Da die Symptome seiner Ansicht nach aber nicht besonders ausgeprägt seien, halte er nervenfachärztliche Nachprüfung für erforderlich.

Bei der daraufhin vorgenommenen fachärztlichen Untersuchung trägt K. zur Vorgeschichte noch nach, daß er im Sommer 1917 einige Tage an Grippe gelitten habe. Er habe sich aber damals nicht krank melden können, es habe weder Revier- noch Lazarettbehandlung stattgefunden. Der Arzt, der ihn bei der eigentümlichen Erkrankung im Sommer 1919 behandelt habe, sei gestorben. Er könne deshalb von demselben ein Zeugnis nicht beibringen. — Der Befund bei der fachärztlichen Untersuchung war im wesentlichen unverändert, wie ihn vorher der Verforgungsarzt geschildert hatte. Der Facharzt bestätigte die Diagnose Parkinsonismus.

Der folgende

Fall 7

stammt aus dem Material der Kehrer'schen Klinik. Lange Zeit wurde in diesem Fall angenommen, daß die bestehenden Krankheitserrscheinungen Folgen eines Unfalls seien, während es sich in Wirklichkeit ebenfalls um einen Parkinsonismus nach epidemischer Encephalitis handelte.

Der Eisenbahner A. Sch. erlitt am 21. 10. 1920 einen Unfall am linken Unterarm, linken Bein, an der linken Schulter und an der linken Beckenseite. Sch. glitt beim Ueber-schreiten der Geleise aus, wurde von einem herannahenden Güterzug erfaßt bezw. griff nach dem Trittbrett eines Wagens und ließ sich, da sich der Zug nur in mäßiger Geschwindigkeit befand, annähernd 15 Meter mitschleifen. Dann ließ er sich fallen. Ein Unfallzeuge gibt an, daß er bei dem Unfall zwar selbst nicht dabei gewesen sei, daß Sch. jedoch in der fraglichen Zeit mit verblutetem Gesicht und zerrissenem Anzug an ihm vorbeigekommen sei. Eine Antwort habe er nicht bekommen. Sch. habe an diesem Tage sehr erschrocken ausgesehen. Am 27. Februar 1924 bat Sch. die Eisenbahndirektion um Heilbehandlung und erwähnt in diesem Schreiben, daß er eine Beule an der linken Stirnseite und Abschürfungen an der linken Gesichtsseite davongetragen habe, und daß sich längere Zeit danach Zittern in den Beinen und im linken Arm und eine Erschwerung der Sprache eingestellt habe. Diefem Gesuch legte er ein Gutachten von Professor T. bei, in dem bescheinigt ist, daß die kloßige Sprache auf seelisch bedingten Innervationsstörungen beruhe, und in dem seine Krankheit als Hysterie bezeichnet wird. Der behandelnde Arzt bescheinigt, daß die Erwerbsfähigkeit des Sch. bis zum 31. Dezember 1922 nicht beeinträchtigt gewesen sei. Vom 1. Januar bis 30. Juni 1923 habe die Erwerbsminderung 30 vom Hundert, bis zum 31. Dezember 1923 50 vom Hundert, seitdem 100 vom Hundert betragen. Die krankhaften Störungen des Sch. werden als durch den Unfall bedingt angesehen.

In einer weiteren ärztlichen Bescheinigung vom 28. Okt. 1924 wird angegeben, daß Sch. durch Unfallfolgen $66\frac{2}{3}$ vom Hundert erwerbsbeschränkt sei.

Am 22. April 1925 bittet Sch. erneut um Heilbehandlung. Der Bahnarzt bescheinigt die Notwendigkeit derselben. Die Deutsche Reichsbahngesellschaft gewährt Sch. eine Heilbehandlung in einem Sanatorium. Hier wird unter dem 13. Oktober 1925

die Diagnose Encephalitis lethargica gestellt, deren Zusammenhang mit dem Unfall nur indirekt angenommen wird.

Wegen eines späteren Antrages auf Gewährung einer Pflegezulage wird Sch. in die Universitätsklinik Münster eingewiesen. Er klagt hier über Verlangsamung der Sprache. Er könne nur langsam kauen und schlucken. Wenn er nach hinten überliege, trete Speichelfluß auf. Im linken Arm habe er keine Kraft, könne ihn nicht viel bewegen. Außerdem bestände Zittern im linken Arm. Rechts beständen eigenartige Bewegungen des Daumens. Manchmal ziehe er das linke Bein nach. Könne sich nicht allein an- und ausziehen und sich nicht allein waschen. Könne auch nicht allein essen.

Die Untersuchung zeigte einen mittelgroßen proportioniert gewachsenen Mann von kräftigem Knochenbau in leidlichem Ernährungszustand. Haut und sichtbare Schleimhäute waren gut durchblutet.

An Herz und Lunge war ein krankhafter Befund nicht zu erheben. Leber und Milz waren nicht vergrößert.

Der Kopf ist nicht klopf- oder druckempfindlich. Austrittsstellen der sensiblen Hirnnerven frei. Kopfbewegungen bis in die Endstellungen möglich, jedoch langsam.

Lidspalten gleich weit. LidSchluß gut mit Lidflattern. Seltener LidSchlag. Während der Untersuchung verfolgt er die Bewegungen des Arztes fast ohne Augenbewegungen mit langsamem Drehen des Kopfes. Augenbewegungen bis in die Endstellen frei. Dabei nyktagische Einstellungszuckungen. Pupillen rund, mittelweit, gleich groß, auf Lichteinfall und Nahesehen ausgiebig, aber nicht sehr prompt reagierend. Augenhintergrund frei. Sensibilität im Gebiet des 5. Hirnnerven erhalten. Die Gesichtsmuskulatur wird nur langsam bei Aufforderung bewegt, dabei zeigt sich eine leichte linksseitige Facialischwäche, sonst fast amimisch.

Die Sprache ist sehr langsam, etwas verwaschen mit geringem Speicheln. Die Zunge wird gerade und unter leichtem Zittern herausgestreckt. Hirnnerven sonst frei.

Die Beweglichkeit beider Arme ist frei. Beiderseits Rigor, links mehr als rechts. Die Kraft im linken Arm ist etwas herabgesetzt. Die Arme werden meist leicht gebeugt gehalten. Links bestehen feine Zitterbewegungen, rechts athetoseartige Bewegungen, die bei Affekten zunehmen. Beim Gehen Mitbewegungen, vor allem des Daumens der rechten Hand. Armreflexe lebhaft und beiderseits gleich. Die Beine sind frei beweglich, der Tonus der Muskulatur ist leicht erhöht,

links etwas stärker als rechts. Die Kraft ist beiderseits gleich. Die Reflexe sind beiderseits in gleicher Stärke auszulösen. Keine krankhaften Reflexe. Keine Ataxie. Gang mit steifem, leicht nach vorn geneigtem Oberkörper. Er kann sich nur teilweise allein ausziehen. Beim Zuknöpfen und einigen anderen Verrichtungen muß ihm geholfen werden. Auch muß er gefüttert werden, da er nur schlucken kann, wenn er nach hintenüber liegt. Psychisch ist er orientiert und geordnet, von freundlichem Wesen, ohne irgend welche Tendenz zur Aggravation. Alle Reaktionen erfolgen verlangsamt, sonst psychisch frei.

In der Beurteilung der Universitätsklinik wird in Uebereinstimmung mit der Diagnose des Sanatoriums bei S. das Vorliegen organischer Veränderungen des Nervensystems als Folge einer Gehirngrippe (Encephalitis lethargica) angenommen.

Fall 8

lernte ich wieder in meiner versorgungsärztlichen Tätigkeit kennen. Es handelt sich dabei um einen Lehrer J. Sch., geboren am 24. 3. 1890. Er stellt unter dem 25. 4. 1922 Antrag auf Militärversorgung und gibt an, im Juni 1916 einen Kopfschuß erhalten zu haben. Infolgedessen habe er viel unter Kopfschmerzen und Uebermüdung zu leiden, sodaß er seinem Beruf nicht voll nachkommen könne. Im September 1914 habe er ferner einen Armschuß erhalten. Davon sei ein teilweise steifes Handgelenk zurückgeblieben. Er sei infolgedessen nicht mehr in der Lage, den Gefangunterricht zu erteilen, weil er nicht mehr Geige spielen könne.

Aus den Akten geht hervor, daß Sch. am 22. 9. 1914 durch einen Gewehrschuß am linken Unterarm verwundet wurde. Bei der Verwundung erfolgte anscheinend eine Fraktur der Ulna dicht unterhalb des Ellenbogengelenks. Nach Abheilung der Verletzung blieb eine Behinderung der Supination um etwa die Hälfte zurück. Ebenso war nachher noch eine geringe Bewegungsbehinderung im Handgelenk vorhanden, die auch nach längerer mediko-mechanischer Behandlung nicht zurückging. Am 8. 6. 1916 wurde Sch. durch einen Granatplitter am Kopf verwundet. Der Einschuß fand sich über dem linken Auge, 1 cm über der linken Augenbraue. Er führte auf Knochen. Der Knochen war eingedrückt, nach den Seiten hin gesplittert. Bei der Aufmeißelung gelangte man in die Stirnhöhle. Da deren Hinterwand anscheinend fest war, wurde nicht weiter eröffnet. Die Wunde heilte unter entsprechender Behandlung allmählich

zu, ohne daß weitere chirurgische Eingriffe erforderlich waren. Bei der Entlassung aus dem Lazarett klagte Sch. noch über gelegentliche Kopfschmerzen. Ein krankhafter Befund war außer der Narbe an der Stirn nicht mehr zu erheben.

Bei der versorgungsärztlichen Untersuchung am 6. 6. 1922 klagte Sch. darüber, daß er die Geige wegen der Versteifung im linken Arm nicht halten könne. Er leide unter leicht eintretender Ermüdung und unter Kopfschmerzen, sodaß er seine Arbeit, besonders bei längerem Aufenthalt in schlechter Luft schlecht ausführen könne. Das versorgungsärztliche Zeugnis ist ziemlich kurz. Außer dem Narbenbefund am linken Arm und an der Stirn wird nur angegeben, daß die Supination links vollständig aufgehoben sei, die Pronation etwa zur Hälfte. Die Bewegungen im Ellenbogen-, Hand- und in den Fingergelenken seien im übrigen vollständig regelrecht und würden mit gewöhnlicher Kraft ausgeführt. Es wird weiter noch angegeben, daß Druck auf die Narbe an der Stirn und auf die Austrittsstellen der oberen und unteren Augennerven schmerzhaft sei. An der Gesichtsmuskulatur zeige sich nichts besonderes. Die gerade herausgestreckte Zunge flimmere leicht. Augenbindehaut- und Hornhautreflexe lebhaft, ebenso Sehlochspiel. Uebrige Reflexe regelrecht. Bei Fußlid-schluß leichtes Lidflattern. Als Krankheitsbezeichnung nennt der Arzt dann:

- a) Behinderung der Drehbewegungen des linken Unterarms um etwa $\frac{2}{3}$.
- b) Leichte Nervenschwäche nach Verletzung der linken Stirnseite mit Eröffnung der Stirnhöhle.

Dienstbeschädigung nimmt er für a) als erwiesen, für b) als wahrscheinlich an und führt zu b) weiter aus, daß die Beschwerden, die sämtlich sich erst nach der Verwundung eingestellt hätten und seit dieser Zeit bestehen geblieben wären, mit großer Wahrscheinlichkeit als Folgen des Kopfschusses anzusehen seien. Die E. M. schätzt er insgesamt auf 20 vom Hundert.

Der das Zeugnis prüfende, leitende Arzt des Versorgungsamts ändert nachträglich ohne nähere Begründung die Krankheitsbezeichnung dahin ab, daß er unter b) für „leichte Nervenschwäche“ — „Narbenbeschwerden“ setzt.

Unter dem 22. April 1925 stellt Sch. Antrag auf Erhöhung der Rente, weil sich sein D. B. Leiden verschlimmert habe.

Er fügt ein ärztliches Zeugnis bei, in dem ausgeführt wird: „Sch. klagt über Aufgeregtheit oft bis zur Verwirrtheit, schnelle Ermüdbarkeit und Schlafsucht, über erschwertes Sprechen, mangelndes Gedächtnis, ferner über Kopfschmerzen. Die Narbe an der Stirn ist etwa 6 cm lang und $\frac{1}{2}$ cm tief in den Schädelknochen eingezogen. Sie ist im ganzen druckempfindlich, besonders der Druckpunkt des nervus frontalis sinister. Es besteht ferner Lidflattern bei geschlossenen Augen, ferner leichtes Händezittern. Leicht erhöhte Erregbarkeit aller Sehnenreflexe und Hautschrift. Nach Art der Verletzung halte ich eine Einwirkung der Verletzung auf die Funktionen des linken Stirnhirns (Broca'sches Zentrum) nicht für ausgeschlossen, wenn gleich außer den allgemeinen, besonders auch in der Sprache gehemmt erscheinenden psychischen Funktionen nur eine allgemeine erhöhte Erregbarkeit festzustellen ist. Es wird eine Röntgenaufnahme des Schädels für wichtig gehalten, besonders wegen Verdachts auf eine Hypophysenveränderung, weil der ganze Gesichtsausdruck etwas an Myxoedem erinnert.“

Das Versorgungsamt läßt dann durch die amtliche Fürsorgestelle Ermittlungen über die Erwerbsverhältnisse und den Gesundheitszustand des Sch. anstellen. Der Rektor des Sch. gibt darauf folgende Auskunft: „Sch. leide an Gedächtnisschwäche. Ein freier Vortrag im Unterricht sei ihm deshalb schwer. Seine Vorbereitung auf den Unterricht nehme übernormale Zeit in Anspruch. Er neige zur Schlafsucht. Bei schwülem Wetter dürfe er nicht auf dem Katheder sitzen, sondern müsse durch Umhergehen im Klassenraume, während des Unterrichts, sich wach zu halten versuchen. Er klage häufig über Kopfschmerzen. Geistig sei er seit der Verletzung im Kriege zurückgegangen. Er zeige äußerlich eine schwache Haltung, die bei einem gesunden Menschen nicht vorkomme. Der geistige Rückgang des Sch. habe mit den Jahren derart zugenommen, daß er sein Amt als Volksschullehrer nicht mehr voll versehen könne.“

Nach Eingang dieser Auskunft wird fachärztliche Begutachtung durch Chirurgen und Nervenarzt angeordnet.

Bei der fachärztlichen Untersuchung klagte Sch. über zunehmendes schlechtes Gedächtnis, der Kopf werde ihm so schwer benommen. Gelegentlich sollen auch Kopfschmerzen vorkommen. Er ermüdet ganz furchtbar leicht. Die Wortfindung sei ihm bei guter Sprechfähigkeit sehr erschwert.

Sonst habe er keine Beschwerden. Auch auf wiederholte Exploration gibt er keine weiteren Klagen an, meint nur, er halte sich so schlecht. Das sei aber ganz einfach eine Folge der Müdigkeit. Wenn er erinnert werde, gehe es ganz gut, bis er sich da dann wieder vergesse.

Bei der körperlichen Untersuchung war an den inneren Organen ein besonderer krankhafter Befund nicht zu erheben. Die Haut- und Sehnenreflexe waren in Ordnung. Pyramidenzeichen fanden sich nicht. Die Pupillen waren mittelweit, rund, rechts gleich links, von prompter und ausgiebiger Reaktion auf Licht. Die Pupillenreaktion war allerdings nur im Dunkelmzimmer festzustellen. Augenbewegungen frei, kein Nyctagmus. Trigemini und Facialis, bis auf leichtes Zurückbleiben der linken oberen Gesichtshälfte o. B. Die gerade hervorgebrachte Zunge zittert gering, feinschlägig, kein Speichelfluß. Keine Sensibilitäts-Störungen. Keine Ataxie. Kein Schwanken bei Fußaugenschluß, wohl aber Lidflattern. Keine Dermographie, kein Tremor der Hände. Keine besondere Schweißabsonderung. Nirgends Motilitätsausfälle. Nirgends Muskelatrophie. Keine Rigidität der Muskulatur irgend eines Körperteils. Kein Intentionzittern.

Der Gang ist etwas schiebend mit losen Knien. Keine Retro- und Propulsion. Die Haltung — aber auch nur diese — erinnert an striären Symptomenkomplex. Sprache ohne Artikulationsstörungen, aber psychogen verlangsamt.

Psychisch macht der 35-jährige Mann einen viel älteren, zerstreuten Eindruck. Die Beobachtung ergibt dann auch, daß Sch. tatsächlich im allgemeinen stark zerstreut ist. Nur die Rücksicht auf sein Verfahren hält ihn während der Exploration in Aufmerksamkeit. Gleichmäßig in seiner Affektlage, ziemlich einförmig im motorischen Verhalten. Keine Maniertheiten. Auffassung und Orientierung sind sonst völlig in Ordnung. Der Gedankenablauf ist nicht besonders verlangsamt, nur durch leichte Ermüdbarkeit erschwert. Inhaltliche Störungen bestehen nicht. Das Gedächtnis ist für gewöhnlich schlecht. Bei wiederholten Prüfungen und wechselndem Ermüdungszustand weiß er aber immer recht Unterschiedliches, sodaß man von einer einheitlichen schlechten Leistung nicht sprechen kann. Das Gleiche gilt von der Merkfähigkeit. Amnesien waren nicht festzustellen.

Die Urteilsfähigkeit ist sowohl gegenüber den üblichen psychiatrischen Prüfungsmethoden, wie im Verhältnis zu den Anforderungen des täglichen Lebens nicht herabgesetzt. Ethische

Begriffe werden so erklärt, wie es von Sch. zu erwarten ist. Bei diesen Prüfungen treten nicht einmal Ermüdungssymptome auf. Im Allgemeinen bietet jedoch die Intelligenzprüfung reichlich Gelegenheit, sich davon zu überzeugen, daß zwar keine besondere Ablenkbarkeit und Unaufmerksamkeit besteht, daß aber Sch. ganz besonders leicht ermüdet, im Ausdruck des Gesichtes schlaff wird und entsprechend immer schlechter seine Kenntnisse reproduziert bzw. zu Neuschlüssen umsetzt.

Nach dieser eingehenden psychischen Befundschilderung wird dann in der Beurteilung ausgeführt, daß bei Sch. eine mäßige Nervenschwäche vorliege. Für eine organische Nervenkrankung sei aber kein Anhalt, im besonderen nicht für Myxoedem, das vom behandelnden Arzt vermutet werde. Auch für Parkinsonismus spreche nichts, trotz der etwas verdächtigen Haltung. Eine Geisteskrankheit sei auch auszuschließen. Dagegen bestehe eine ganz ausgesprochene leichte geistige Ermüdbarkeit, die nicht mit dem Worte „Neurasthenie“ abgetan werden könne, besonders auch nicht bei dem sonst für die Diagnose „Neurasthenie“ doch nur geringen Befunde. Es sei vielmehr anzunehmen, daß doch irgendeine nicht gerade zu gröberen Symptomen führende Dauerschädigung des Hirns nach Schußverletzung vorliege, wenn auch der Röntgenbefund keinen Anhalt biete und auch aus den Krankenblättern nicht hervorgehe, daß eine Hirnverletzung vorgelegen habe. Für die geistige Schwäche wird Vorliegen von D. B. für wahrscheinlich gehalten und die dadurch bedingte Erwerbsminderung unter Berücksichtigung des Berufes als Lehrer auf 30 vom Hundert geschätzt.

Unter dem 2. 12. 1926 beantragt Sch. erneut Erhöhung der Rente, weil sich sein „Kopfleiden“ in den letzten Wochen wesentlich verschlimmert habe. Zur Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit als Lehrer sei er vorläufig nicht mehr in der Lage. Er bittet gleichzeitig um Gewährung einer Badekur.

In einer dem Antrag beigefügten ärztlichen Bescheinigung vom 2. 12. 1926 wird ausgeführt, daß das Kriegsdienstbeschädigungsleiden des Sch. (leichte geistige Ermüdbarkeit) sich in den letzten Wochen so sehr verschlimmert habe, daß Sch. die nächsten 8 Wochen vollständig aussetzen müsse. Der Arzt hält, um einer vorzeitigen Pensionierung vorzubeugen, eine Sanatoriumskur im Mittelgebirge für unbedingt erforderlich.

Am 7. 12. 1926 erfolgt daraufhin versorgungsärztliche Untersuchung. Bei der Untersuchung klagt Sch. über dumpfes

Gefühl im Kopf und schnelle Ermüdung. Bei dumpfer Luft könne er den Unterricht im Schulzimmer nicht aushalten. Die Sprache sei undeutlicher geworden. Er sei steif in den Gliedern geworden.

Bei der Untersuchung wurde ein krankhafter Befund am Nervensystem nicht erhoben. Es wird jedoch angegeben, daß Sch. in etwas vorgebeugter Haltung mit leicht eingeknickten Knien dastehe. Auch beim Gehen würden die Kniee nicht völlig durchgedrückt. Bewegungsstörungen in den Gliedmaßen waren nicht festzustellen. Keine Muskelstarre. Kein Intentionszittern. Die Sprache sei verwachsen, aber fließend. Antworten erfolgten prompt. Die Bewegungen, z. B. beim An- und Ausziehen erfolgten nur langsam und mit einer gewissen Schwerfälligkeit. In der Beurteilung wird ausgeführt, daß eine Badekur nicht für erforderlich gehalten werde, weil von derselben irgendwelcher Erfolg kaum zu erwarten sei. Dagegen hält der Versorgungsarzt zur Entscheidung des Rentenerhöhungsantrages bei der Schwierigkeit der Beurteilung des Falles nochmalige fachärztliche Begutachtung für erforderlich.

Am 7.1.1927 erfolgt darauf erneute nervenfachärztliche Begutachtung. Dabei gibt Sch. an, daß er bis ungefähr vor 3 Wochen seinen Dienst noch habe versehen können. Der Schulrat habe aber dann veranlaßt, daß er sich krank melde. Er könne den Dienst nicht machen, er würde immer so leicht müde, könne es in der dumpfen Schulluft nicht aushalten. In frischer Luft werde es besser. Er habe viel Kopfschmerzen, die immer in der linken Köpfhälfte säßen, zeitweise aber auch in der Stirn. Außerdem habe er „Augenstörungen“ gehabt, das heißt, die Augen würden müde, namentlich durch langes Lesen. Er könne nicht mehr lernen, nicht ordentlich auffassen und behalten. Was aber von früher her im „Unterbewußtsein bei ihm sitze“, das könne er noch. Er gehe so steif auf der Straße. Das sei auch schlechter geworden. Sonst habe er keine Beschwerden. Die Stimmung sei noch ganz heiter. Er ärgere sich nicht leicht.

Auch auf wiederholtes Befragen wird das Ueberstehen einer Grippe oder einer fieberhaften Erkrankung negiert.

Die Nachprüfung des Allgemeinzustandes ergab keine wesentliche Veränderung gegenüber der letzten fachärztlichen Untersuchung. Sch. zeigt aber jetzt die typische Parkinsonhaltung in ausgesprochener Weise. Der Gesichtsausdruck ist stets gleichmäßig starr. Bei der Untersuchung des Nervensystems

zeigt sich, daß die Armreflexe rechts sämtlich besser zu haben sind als links. Im übrigen sind die Reflexe in Ordnung. Pupillen und Hirnnerven o. B. Keine Pyramidenzeichen. Die Zunge wird nur ganz gering, unter lebhaftem grobschlägigen Zittern gerade hervorgebracht. Kein Speichelfluß, keine Motilitätsstörungen. Keine Ataxie, kein Romberg. Leichtes Vibrieren des linken Mundfacialis und des rechten Orbicularis oculi, sonst keine Tremorererscheinungen, insbesondere aber auch kein Intentionszittern. Keine besondere Schweißabsonderung, keine Hautschrift.

Der Gang sei wie früher, etwas schiebend mit losen Knieen, zeige jetzt aber schon deutliche Retropulsion. Keine Propulsion. Sprache schwerfällig, aber ohne eigentliche Artikulationsstörungen. Arme in typischer Parkinsonhaltung. Nach Ansicht des Facharztes ist die früher schon beschriebene aufgehobene Rotation des Unterarmes, die früher als Verwundungsfolge angesehen wurde, lediglich auf die Parkinsonhaltung zurückzuführen. Leichte Rigidität beiderseits in Armen und Beinen. Leichte Adiadochokinesie beider Arme. Psychisch macht er einen stumpfen benommenen Eindruck und sei entsprechend schlecht in seinen geistigen Reproduktionen. Merkfähigkeit nicht herabgesetzt. Gedächtnis für die Vergangenheit offenbar besser. Nicht auffällig gefühllos. Leichte Ermüdbarkeit beherrsche das Bild.

Es wird dann die Diagnose Parkinsonismus nach epidemischer Encephalitis gestellt und die Erwerbsminderung auf 70 von Hundert geschätzt. — — —

Lange Jahre verkannt wurde auch der nächstfolgende

Fall 9.

Erst durch eingehende nervenärztliche Begutachtungen und Beobachtungen in der Münsterischen Nervenlinik fand der Krankheitsfall seine Aufklärung. Es stellte sich dann einwandfrei heraus, daß B. an einer, wenn auch nicht sehr ausgeprägten epidemischen Hirnentzündung litt.

W. Br. gab bei der Untersuchung zur Vorgeschichte an, daß die Blutsverwandten außer einer Schwester, die an Asthma leide, gesund seien. Er selbst sei im Oktober 1916 zu den Jägern eingezogen worden, im Februar 1917 sei er ins Feld, und zwar nach Mazedonien gekommen. Im Mai 1917 wurde er verwundet durch einen Granatsplitter am Hinterkopf. Bei der Verwundung sei er etwa 20 Minuten bewußtlos gewesen. Im Feldlazarett sei er operiert worden. Sei dann noch einige

Wochen im Kriegslazarett gewesen und habe im August 1917 3 Wochen Erholungsurlaub in der Heimat gehabt. Dann sei er 4 Monate zu Arbeiten in der Kriegswirtschaft abkommandiert worden. Im August 1918 sei er mit einer Erwerbsminderung von unter 10 vom Hundert aus dem Heeresdienst entlassen worden; warum, wisse er nicht. 14 Tage später sei er wieder untersucht und erneut eingezogen worden. Nach 4 Wochen Garnisondienst kam er wieder ins Feld. Konnte jetzt aber das Einschlagen der Granaten nicht mehr vertragen und wurde deshalb zu den Essenträgern abkommandiert. Am 5. Oktober 1918 wurde er am Fuß verwundet und geriet in amerikanische Gefangenschaft, in der er bis Mai 1919 verblieb. War danach noch einige Zeit in Deutschland in Lazarettbehandlung wegen Folgen der Verwundung am Fuß. Zu Hause habe seine Schwester gleich nach seiner Rückkehr zu seiner Mutter gesagt: sie sei bange vor seinem Blick. Er sei oder werde verrückt. Seit 1917 habe er unter Kopfschmerzen zu leiden gehabt. Nach der Entlassung in die Heimat im Jahre 1919 habe er dreiviertel Jahre wegen der Kopfschmerzen nicht gearbeitet. Nahm dann Arbeit als Schweißer auf, übte diese Tätigkeit aber nur 3 Tage aus, weil er die Hitze am Kopf nicht vertrug. Er wurde deshalb Kranwärter und arbeitete als solcher bis 1923. Dann meldete er sich als Bote zur Stadtverwaltung. Im Jahre 1920 sah er 3 Tage lang alles doppelt, nebeneinander. Das Doppelsehen trat beim Gehen zur Arbeit plötzlich auf der Straße auf, sodaß er sehr erschrak. Er mußte von Kollegen nach Hause gebracht werden. Legte sich dann zu Bett und war 4 Tage bettlägerig. Das Doppelsehen trat dann nicht wieder auf. Er sei damals sehr aufgeregt gewesen, warum, wisse er nicht. Habe sehr schlecht geschlafen, sodaß er vor Müdigkeit nicht zur Arbeit gehen konnte. Solche Zustände habe er seitdem öfter gehabt. Im Mai 1927 wurde er abgebaut. Seit 3 bis 4 Jahren leide er unter Schwindelanfällen. Diese Schwindelanfälle treten meist beim Bücken, ganz gelegentlich beim Gehen, häufiger beim Sitzen (im Büro) auf. Es werde ihm so dumpf im Kopf, schwarz oder grün oder gelb vor den Augen. Die ständig bestehenden Kopfschmerzen werden stundenlang vor den Schwindelanfällen schlimmer. Es werde ihm, wie wenn sich das Zimmer drehe und dann falle er um. Wenn er dann wieder zu sich komme, habe er noch ein dumpfes Gefühl. Wisse sich nicht zu besinnen. Wenn er nicht aufgehoben werde, bleibe er liegen, bis er wieder von

selbst zu sich komme und sich allmählich aufrichte und aufstehe. Derartige Schwindelanfälle kämen bald alle Wochen zweimal, manchmal auch nur alle 14 Tage vor. Seit April 1927 beständen bei ihm auch eine Art epileptischer Anfälle. Diese träten meist beim Stehen alle 10-20-60 Tage, und zwar mitunter einige Stunden nach den Schwindelanfällen auf. Ihr Herannahen merke er gelegentlich auch an dumpfem Druck. Einmal habe er sich nachts im Bett hin und her gedreht und es war ihm, wie wenn ein Anfall käme, sodaß er die Mutter, die nebenan schlief, rief. Bis die Mutter aber gekommen sei, sei es vorbei gewesen und der Anfall erst am nächsten Vormittag gekommen. Was in diesen Anfällen vor sich gehe, wisse er nur von der Umgebung, zum Beispiel von den Eltern oder anderen Bekannten bzw. Vorgesetzten im Dienst. Ein Beamter habe ihm erzählt, er habe es dabei wie bei einem Sturmangriff im Felde machen wollen, habe mit vorstehenden Augen so getan, als werfe er Handgranaten, habe kommandiert usw. Als der Beamte ihn geschüttelt habe, sei er zu sich gekommen. Im April oder Mai 1927 habe er einen Anfall gehabt, der kein Ende nehmen wollte, sodaß die Mutter zum Arzt schickte. Er sei dabei zu der Nachbarin gegangen und habe deren Tochter, die er mit der Dienstmagd verwechselte, gesagt, sie solle anderen Tags zur Mutter zum Waschen kommen, obwohl diese gar keine Wäsche hatte. Zu Hause habe die Mutter ihn ins Bett gelegt. Er habe dann getobt und habe geglaubt, es sei ein Fliegerangriff. Den Arzt habe er als einen, diesem ähnlichen Kollegen aus der Gefangenschaft angesehen. Der Arzt habe ihm eine Spritze gegeben. Im Mai 1927 habe er im Krankenhaus zweimal solche Anfälle gehabt, in denen er Sturmangriffe machte. Die Mutter habe ihm erzählt, er habe in einem Anfall davon gesprochen, daß ihm sein uneheliches Kind, das bei seiner Tante untergebracht sei, geraubt werde.

Seitdem die Kopfschmerzen bei ihm beständen, könne er sich nicht mehr so freuen, sei ernster geworden. Habe immer das Gefühl, als ob er verrückt werde. Habe häufig ein Angstgefühl, umfallen zu müssen. Wenn er ermüdet sei, schlafe er gut. Wenn er keine Tätigkeit habe, könne er stundenlang wegen seiner Kopfschmerzen nicht einschlafen. Seit 3 Jahren merke er, daß ihm das Wasser im Munde zusammenlaufe. Er schlucke den Speichel herunter oder werfe ihn aus. Seit der Verwundung leide er etwas an Gedächtnisschwäche. Seit 4-5 Jahren habe er einen Sprach-

fehler, vor allem wegen des Speichelns, aber auch wegen der Verlangsamung des Gedankenablaufs. Beim Essen blieben ihm in den letzten Jahren die Speiserefte zwischen den Zähnen hängen. Ein trockenes Stück Brot oder Fleisch könne er nicht herunterchlucken, obwohl er zuviel Speichel habe. Diesen müsse er aber herunterchlucken, daher könne er den trockenen Bissen nicht einspeicheln. Er sei dauernd am Schlucken. Müsse alle paar Stunden essen, sonst werde er schlapp. Seit Jahren werde ihm auch von seiner näheren Umgebung vorgehalten, daß er in allem so langsam sei, daß er das dreibis vierfache der Zeit brauche wie der Gefunde, auch beim Essen, Anziehen und dergleichen. Er selbst merke das nicht. Bei den Mahlzeiten schlafe er beinahe ein, sodaß die Mutter ihn anrufen müsse. Die Abendmahlzeit dauere wohl dreiviertel Stunden.

Aus den Aktenangaben ist folgendes von Belang:

Am 20. 5. 1917 durch Streifschuß am Kopf verwundet. War eine halbe Stunde bewußtlos.

Befund am 21. 5. 1917: „In der Tiefe liegt in 3 cm der Knochen frei, Knochenhaut leicht verletzt. Oberfläche geritzt. Puls zwischen 60 und 70, bei Temperatur von 37,8 Grad C. Fundus o. B. Keine Hemianopsie, Schmerzen im linken Auge, keine Doppelbilder, keine Lähmungen.

Unter dem 8. 7. 1917 liegt ein Bericht des Kompagnieführers, einer Bahnaufbaukompagnie vor: „B. kam versehentlich zur Kompagnie, leidet unter starken Kopfschmerzen, die Arbeiten in der Sonne unmöglich machen. Heute nacht beim Postenstehen Schwindelanfall mit längerer Bewußtlosigkeit.“

Ferner geht aus den Akten hervor, daß B. am 9. 2. 20 in ein Krankenhaus aufgenommen wurde. Er wurde mit Fieber eingeliefert, war leicht benommen, hatte Bronchitis. Die linke Pupille war weiter als die rechte. Schwäche des linken äußeren Augenmuskels. Doppelsehen beim Blick nach links. Anfangs bestanden sehr heftige Kopfschmerzen, diese milderten sich nach Schwinden des Fiebers. Die Stimmung war sehr gedrückt. Links bestand angedeuteter Fußclonus. Im Krankenhaus wurde die Diagnose „Grippeartige Erkrankung“ gestellt.

Am 16. 2. 1920 erhob ein Augenarzt folgenden Befund: „Nur ganz schwache Pupillenreaktion auf L. und C., links noch schlechter als rechts. Aeußere Sehnervenkopfbegrenzung

nicht scharf. Venen des Fundus links stärker gefüllt als rechts. Gesichtsfeld o. B., Spur Bewegungseinschränkung der Augen nach außen.“

Unter dem 21. 2. 1922 gibt ein Nervenarzt an, daß B. spontan gelacht habe, er stoße beim Sprechen manchmal an. Die Sprachprobe zeigte jedoch nichts besonderes. Augenhintergrund o. B. Keine Doppelbilder. Geringes ständiges Horizontalzittern. Träge Reaktion auf Lichteinfall. B. gab damals an, daß er im Herbst 1921 noch einmal 2 Tage an Doppelsehen gelitten habe. Ueber Schwindelanfälle klagte er damals nicht.

Ferner befindet sich bei den Akten eine Mitteilung desselben Nervenarztes aus dem April 1924. B. habe damals angegeben, daß er vor 3 Wochen zum erstenmal einen Schwindelanfall gehabt habe. Seitdem bestehe häufig Rollen im Kopf, und zwar meistens beim Bücken. Er könne schlechter gehen. Seine Nervosität sei stärker geworden, er sei so schreckhaft. Der Nervenarzt gab damals an, daß ebenso wie früher eine gewisse Hast im Wesen bei B. bestehe. Es wurde eine Liquoruntersuchung vorgenommen, die keinen krankhaften Befund ergab.

Bei einer verforgungsärztlichen Untersuchung im Februar 1926 klagte B. über eine Zunahme der Schwindelanfälle, die jetzt 2 bis 3 mal in der Woche auftreten sollten. Er gab damals an, daß 5 bis 6 mal im Jahr auch Schwindelanfälle aufträten, die mit Bewußtlosigkeit einhergingen.

Aus dem April 1926 liegt ein Bericht der Stadtverwaltung, bei der B. beschäftigt war, vor, wonach B. während des Dienstes wiederholt Ohnmachtsanfälle erlitten hatte.

Vom 18. 3. bis 14. 4. 1926 weilte B. zur Kur in Driburg. Im Kurbericht ist vermerkt: „Auffallend ist der starre Blick. Anfangs unruhig, schlief nachts nicht, störte. Keine Bewußtseinsstörungen beobachtet“.

In einer Bescheinigung des behandelnden Arztes aus dem April 1926 werden heftige Krampfanfälle mit völliger Bewußtseinsstörung und hochgradiger Unruhe angegeben.

Aus einer Befundschilderung des für B. zuständigen Stadtarztes vom 3. 3. 1927 ist hervorzuheben: „Pupillen noch träger als früher, ferner Anzeichen für Demenz, besonders während er sich unbeobachtet in der Öffentlichkeit bewegt.“ Ferner ein Befund vom 26. 4. 1927: „Befund wie früher, außerdem Fukclonus, Romberg, Sprache verwachsen und

ohne ausgesprochene Klangfarbe. Einwandfreie Krampfanfälle, auch auf der Straße. Tagtägliche Anfälle, geht dabei sogar mit Gegenständen auf Personen los.“

Im Befundbericht bei einer versorgungsärztlichen Untersuchung am 26. 4. 1927 heißt es: „Gehemmt, selbst wenn er sich seiner Meinung nach erregt hat. Motorisch langsam, schlaff. Hemmung des Gedankenablaufs, Auffassungsverlangsamung. Gedächtnis nicht gestört, Merkfähigkeit herabgesetzt.“

Am 1. 12. 1927 wurde B. auf Veranlassung eines Versorgungsgerichts in die Münsterische Nervenlinik zur Beobachtung eingewiesen. Die richtige Diagnose war bis zu diesem Zeitpunkt, trotz der vielfachen ärztlichen Untersuchungen, nicht gestellt worden.

B. befand sich damals in mittlerem Ernährungszustand. Das Gesicht war etwas bläulich verfärbt, fühlte sich heiß an, zeigte leichten, aber deutlichen Fettglanz. Die Ohren waren dunkelrot, Lippen und Schleimhäute stärker gerötet. Gesichtszüge sehr wenig belebt, ausgesprochen starrer Blick der feucht glänzenden Augen. Verminderte Mimik, geringer Antrieb zu allen Bewegungen. Gebundene leicht pagodenhafte Haltung im Sitzen, Stehen und Gehen.

Ueber dem linken Hinterhaupt 2 cm über die Mittellinie nach rechts reichend eine 9 cm lange, 1 bis 1½ cm breite leicht bogenförmige, über der Unterlage verschiebbliche Hautnarbe. Oberhalb der Narbe hat man den Eindruck einer ganz leichten Knochenrinne. Keine Druck- oder Klopfempfindlichkeit. Rechte Pupille etwas weiter als die linke. Sämtliche Bewegungen beider Pupillen (auf Licht, auf Convergence, auf Schmerzreize usw.) sehr unausgiebig und träge, Tränen- und Speichelsekretion dauernd erhöht. Sprache normal, daneben aber noch, vor allem infolge mangelhafter Kieferöffnung, ausgesprochen „nuschelig“ und monotone, singende, fast zeitweise unverständliche Silben und Worte. Mund dauernd leicht geöffnet. Atemfrequenz herabgesetzt (Bradypnoe); Atmung oberflächlich, erfolgt ab und zu unter tiefer, hörbarer In- und Expiration.

Tonus in den Extremitäten leicht erhöht. Erhöhung des Dehnungswiderstandes und des formgebenden Tonus bei passiven Bewegungen. Neigung zu kataleptischen Haltungen. Im Sitzen ab und zu eben merkliches myorrhythmische Zucken. Gibt an, seit Jahren zu merken, daß bei stärkerem unwillkürlichen Zittern des linken Beines das Sprechen besser

von Statten gehe. Sensibilität o. B. Keine krankhaften Reflexe, dagegen hochgradige Erweiterung der Reflexzonen. Kniereflex läßt sich vom ganzen Unterschenkel bis Fußrand auslösen. Pseudofußclonus. Der obere Bauchdeckenreflex läßt sich bis zur 5. Rippe, der untere vom oberen Teil der Oberschenkel-Innenseite auslösen. Steigerung des Gänsehautreflexes und Dermographie am ganzen Körper.

Herz: Erste Töne nicht so scharf wie die zweiten. Tätigkeit regelmäßig. Puls 78, o. B.

Im psychischen Bilde fällt ein Zustand auf, der Stumpfsinn vortäuscht. Er wird durch mehr oder weniger plötzliches sich zum Wort melden unterbrochen. Am Schluß einer ärztlichen Besprechung sprang er plötzlich auf und sagte mit etwas unheimlichem Tonfall: „Ich gehe in die Aa, es hat doch keinen Zweck.“ Auf Zureden erklärte er, er sei schlapp, er habe Hunger.

Während der klinischen Beobachtung wurde am zweiten Tage, als B. im Bett lag, von einem Mitpatienten ein Anfall beobachtet, der so verlief, daß er den Kopf nach links und rechts gedreht, dann die Hände senkrecht nach oben gestreckt, hin und her geschlagen und Hurra und auch sonst geschrien hatte.

Bei längerem Gehen fiel auf, daß er rasch lief, wenn er im Gang war, dann aber bei einer neuartigen Strecke, zum Beispiel bei einer Treppe viel langsamer ging. Bei den Besprechungen versprach er sich gelegentlich einmal, indem er Daten verwechselte. Im übrigen aber waren seine Angaben chronologisch und logisch zutreffend, verrieten keine Zeichen echter Gedächtnisschwäche oder Urteilschwäche. Auch die Merkfähigkeit erwies sich nicht als ausgesprochen krankhaft eingeschränkt, wenn auch stellenweise die Äußerungen langsam herauskamen. Seinen Zustand beurteilte er mit der möglichsten Objektivität.

In der Kehrer'schen Klinik wurde auf Grund dieses Befundes erstmalig die Diagnose „Encephalitischer Parkinsonismus“ gestellt.

Wenn man nun der Reihe nach die einzelnen Fälle betrachtet, so ist zu den beiden ersten, bereits von Stern veröffentlichten Fällen eigentlich nicht viel zu sagen. In beiden Fällen handelt es sich um ein Krankheitsbild, das in seinen

Erscheinungen durchaus eindeutig ist. In beiden Fällen war aus der Anamnese eine Krankheit bekannt, die an das akute Stadium der epidemischen Encephalitis denken lassen mußte. Trotzdem ist in beiden Fällen der wahre Charakter des Leidens von einer ganzen Reihe von Aerzten, darunter auch von Fachärzten verkannt worden. Die schweren Krankheitserscheinungen, die eindeutig auf eine organische Erkrankung hinwiesen, und die typische Vorgeschichte waren nicht in der Lage, die begutachtenden Aerzte von der Diagnose „Hysterie“ abzubringen. Es mag zwar im Fall II zunächst irreführend gewesen sein, daß F. nach der Anamnese konstitutioneller Psychopath war und bereits während des Krieges hysterisch reagiert hatte. Im übrigen wird aber, wie die übrigen Fälle zeigen und worauf insbesondere auch Stern hinweist, die chronische epidemische Encephalitis offenbar gerade besonders häufig mit hysterischen Zuständen verwechselt. So wird denn auch im Fall III auch von fachärztlicher Seite zunächst eine Hysterie angenommen, obwohl, wie der Befund der Kehrerschen Klinik zeigt, auch hier das Krankheitsbild ein ziemlich eindeutiges war. Es fehlen allerdings im Fall III im Gegensatz zu den beiden ersten Fällen in der Vorgeschichte genauere Angaben über eine vorausgegangene Erkrankung, hinter der man eine Encephalitis hätte vermuten müssen. Der Patient gab zwar an, im Winter 1915-16 im Felde an einer Grippe gelitten und deshalb 14 Tage mit Fieber, Kopfschmerzen, Mattigkeit und Schnupfen im Revier gelegen zu haben. Die objektiven Angaben darüber sind jedoch nur dürftig und lassen Symptome, die für die epidemische Encephalitis fast als pathognomisch anzusehen sind, wie Schlafsucht, Benommenheit, Doppelsehen vermissen.

Im Fall IV ist in der Vorgeschichte von einer überstandenen grippeartigen Erkrankung überhaupt keine Rede. Es wird lediglich auf genaueres Befragen nachträglich mitgeteilt, daß im Jahre 1923 acht bis zehn Tage eine Darm-erkrankung vorgelegen habe. Daß bei den Angaben über diese Erkrankung nicht unbedingt an eine Encephalitis epidemica gedacht werden mußte, ist ohne weiteres zuzugeben.

Hervorzuheben ist bei Fall IV, daß hier das Krankheitsbild nicht wie in den drei vorhergehenden Fällen von den Vorgutachtern nur als ein funktionell-nervöses angesehen wurde. Einer der begutachtenden Aerzte — es handelte sich in diesem Fall um einen Facharzt — nahm das Vorliegen eines Hirntumors an. Zu Verwechslungen mit einem Hirn-

tumor geben übrigens, wie eine Abhandlung von A. Rabinowitsch zeigt, gelegentlich solche Fälle Anlaß, bei denen es sich um schlafähnliche Zustände handelt. Im Gegensatz zu Rabinowitsch muß aber betont werden, daß auch in dem von ihm selbst beobachteten Fall, ebenso wie in den von ihm erwähnten Fällen anderer Autoren (Parker u. a.), die übrigen Symptome so von dem Bilde des encephalitischen Parkinsonismus abweichen, daß es nicht berechtigt ist, von „Hirntumor unter dem Bilde einer epidemischen Encephalitis“ zu sprechen. Der in der Münsterischen Klinik bei Fall IV erhobene Befund läßt nicht erkennen, was den Arzt dazu bewogen hat, das Vorliegen eines Hirntumors anzunehmen.

Interessant ist die Verkenntung des Krankheitsbildes im Fall V. Die krankhaften Veränderungen haben sich hier durchaus nicht etwa der Beobachtung des Untersuchers entzogen. Er legt sie vielmehr im Gegenteil in der Befundniederschrift ziemlich bis ins einzelne fest. Auch seine Diagnose „Bewegungsbehinderung im rechten Arm und Bein als Folge einer „Neuritis nach Malaria“ zeigt, daß der Gutachter durchaus den Eindruck hatte, ein organisch bedingtes Leiden vor sich zu haben. Aus der Befundschilderung und der Diagnose geht aber auch deutlich hervor, daß der Arzt mit den einzelnen Symptomen, zum Beispiel der Adiadochokinesie, nichts anzufangen, sie nicht zu deuten wußte. Der striäre Symptomenkomplex stellte für ihn offenbar eben etwas Unbekanntes bezw. Neuartiges dar.

Hinweisen möchte ich bei Fall V noch darauf, daß der amyostatische Symptomenkomplex anscheinend unmittelbar im Anschluß an eine bakteriell nachgewiesene Malariaerkrankung in die Erscheinung getreten ist, denn der Patient gab ja an, daß die Behinderung in der rechten Hand beim Schreiben sich erstmalig in der Zeit der Lazarettbehandlung wegen Malaria im Jahre 1918 bemerkbar gemacht und seitdem fortbestanden habe. Es könnte danach meines Erachtens schließlich jemand versucht sein, diesen Fall als eine Stütze für die neuere Anschauung einiger französischer Forscher, u. a. Séval anzusehen, wonach die Encephalitis epidemica überhaupt keine „autonome“, epidemische, durch irgendwelche pathogene Keime verursachte Krankheit darstellt, sondern auf einer alimentären Massenvergiftung beruhe, verursacht durch toxische Derivate von Surrogaten, die infolge der Kriegswirtschaft der Ernährung, insbesondere dem Broterlass dienen mußten. Die Grippe, bezw. irgendeine andere inter-

kkurrente fieberhafte Erkrankung soll nur das auslösende Moment für eine toxische Encephalitis sein, ebenso wie das Delirium tremens bei einem Alkoholiker, der etwa an einer Pneumonie erkrankt ist, nicht Folge des Pneumonie- oder eines sonstigen Virus, sondern eben Folge der Alkoholintoxikation ist. Nun teilt Filimonoff in seiner Abhandlung „Motorische Anfälle bei Erkrankungen des extrapyramidalen Systems“ ebenfalls einen Fall mit, in dem die Symptome der chronischen epidemischen Encephalitis unmittelbar nach Abklingen des Fiebers einer Malariaerkrankung auftraten. Genauere Exploration ergab jedoch dann, daß bei dem Patienten drei Jahre vorher eine Erkrankung mit den typischen Symptomen der Encephalitis epidemica, zum Beispiel mit Doppelsehen, bestanden hatte. Ebenso ergaben Erhebungen, daß der Patient seiner Umgebung auch schon vor der Malariaerkrankung etwas sonderbar erschienen war, daß unter anderem auch zeitweilig schon vorher geringes Zittern bestanden hatte. Man wird also hier höchstens annehmen können, daß die weitere Schädigung des Körpers durch die interkurrente Malaria beschleunigend auf den schon bestehenden chronischen encephalitischen Prozeß gewirkt hat. In meinem Fall V ist zwar von einer grippösen Erkrankung vor der Malaria-Erkrankung im Jahre 1918 keine Rede. Der Patient hat aber dagegen an einer Stelle beiläufig erwähnt, daß er 1916 an einer Erkältung gelitten habe. Wenn auch keinerlei Anhaltspunkte dafür bestehen, daß damals eine ernstere Erkrankung vorgelegen hat, so kann aber auch nicht ohne weiteres unterstellt werden, daß es sich nur um etwas ganz und gar Harmloses handelte, da sonst nicht anzunehmen wäre, daß der Patient diese Angelegenheit noch bei den Untersuchungen im Jahre 1924 erwähnt hätte. Wenn man nun berücksichtigt, daß der Patient sich zur Zeit dieser Erkältung in Leitmeritz an der Elbe, also in Böhmen, befand und daß Economo im selben Jahre in Wien die erste Encephalitisepidemie beobachtete, so scheint mir durchaus die Möglichkeit vorzuliegen, daß es sich bei der „Erkältung“ im Jahre 1916 bereits um die Infektion mit dem Erreger der epidemischen Encephalitis gehandelt hat. Diese Möglichkeit hat im übrigen im Fall V nach dem Akteninhalt keiner der Gutachter, auch nach Sicherung der Diagnose, in Erwägung gezogen.

Im Fall VI ist die Krankheit ebenfalls Jahre lang nicht diagnostiziert worden. Der Arzt, der den Patienten zwei Jahre lang beobachtet hatte, spricht nur von einem „Nerven-

leiden“ und in seiner Befundschilderung erwähnt er überhaupt nichts von den typischen Symptomen des Parkinsonismus, obwohl diese nach dem 4 Wochen später erstatteten Gutachten des Versorgungsarztes damals schon deutlich ausgeprägt waren. Auch der Versorgungsarzt, der nach seinen Ausführungen im Gutachten einen ganz charakteristischen Befund erhob und im übrigen auch gleich die richtige Diagnose stellte, fühlte sich bei seiner Diagnose nicht ganz sicher. Er empfahl vielmehr fachärztliche Nachprüfung, da seiner Ansicht nach der striäre Symptomenkomplex nur wenig ausgeprägt vorhanden war.

Gemeinsam ist in den drei nächsten Fällen, daß in den Vorgeschichten nachweislich ein Trauma ernsterer Art vorkommt und daß die Erkrankten, und zwar sicherlich nicht nur im Interesse einer entsprechenden Entschädigung durch Rente, sondern wohl auch aus einem natürlichen Kausalitätsbedürfnis heraus, die bei ihnen bestehenden Krankheitserscheinungen auf das Trauma zurückführen. Es ist ohne weiteres zuzugeben, daß die Diagnosefindung dadurch erschwert wurde, besonders in den beiden letzten Fällen, in denen eine Schädelverletzung durch Schuß vorlag.

Anhaltspunkte für eine vorausgegangene grippeartige Erkrankung waren im Fall VII nicht vorhanden. Nach der Schilderung eines Zeugen, der den Verletzten kurz nach dem Unfall sah, muß das Trauma ein recht eindrucksvolles gewesen sein. Daß bei dieser Sachlage unter anderem auch an eine hysterische Reaktion auf das Trauma bzw. an eine Rentenhysterie gedacht werden konnte, ist durchaus verständlich.

Bei Fall VIII haben anscheinend lange Zeit psychische Veränderungen das Krankheitsbild beherrscht, während der körperliche Befund offenbar zunächst nur gering war. Erschwert wurde die Diagnostizierung ferner wieder dadurch, daß eine schwere Schädelverletzung vorausgegangen war. Der Patient klagte ständig über Kopfschmerzen. Diese konnten durch die Schädelverletzung leicht erklärt werden, während sie dagegen in das Bild einer chron. epidemischen Encephalitis weniger hineinpaßten. Es fehlten außerdem auch hier wieder jegliche Anhaltspunkte für eine vorausgegangene grippeartige Erkrankung.

Wie aus der Befundschilderung im ersten fachärztlichen Gutachten hervorgeht, waren die psychischen Veränderungen im Fall VIII allerdings ziemlich charakteristisch für die chronische

epidemische Encephalitis, und zwar waren sie bereits vor der fachärztlichen Untersuchung so ausgeprägt, daß sie sogar einem medizinischen Laien als krankhaft und exogen bedingt erschienen. Die Ausführungen des Schulrektors des Patienten weisen nämlich bereits deutlich auf den Charakter des Leidens hin. Der Rektor hat offenbar gut beobachtet und schildert typische Symptome der chronischen epidemischen Encephalitis: Die Verlangsamung des geistigen Geschehens, die Schlafsucht, die den Erkrankten zwingt, während des Unterrichts im Schulzimmer umherzugehen, um sich wach zu halten und seine „schwache Haltung, die bei einem gesunden Menschen nicht vorkomme“.

Wie weitgehend übrigens die Psyche durch die epidemische Encephalitis beeinflusst werden kann, zeigen die Veröffentlichungen Bonhoeffer's über die encephalitischen Charakterveränderungen bei Kindern. Erwähnenswert ist in dieser Hinsicht auch ein von A. Langen veröffentlichter Fall. Es handelt sich dabei um einen jungen Mann, der zwar aus einer Psychopathenfamilie stammte, aber bis zu der in Frage stehenden Tat nie mit dem Strafgesetz in Konflikt gekommen war. Einige Jahre vor der Tat war er an Encephalitis epidemica erkrankt und litt in der Folgezeit sehr unter dem chronischen Stadium derselben. Eines Tages nun lockte er einen Knaben abseits und erwürgte ihn. Er stellte sich dann kurz darauf selbst dem Gericht und schilderte die Tat mit allen Einzelheiten. Während der Beobachtung durch A. Langen gab er zur Erklärung an, er habe unter dem Zwange gelebt, nur dann wieder gesund werden zu können, wenn er einen anderen Menschen getötet habe. A. Langen hielt in diesem Falle die Voraussetzungen des § 51 Str. G. B. für erfüllt und macht in überzeugenden Ausführungen weitgehende seelische Veränderungen durch die epidemische Encephalitis dafür geltend.

Im Fall IX läßt sich aus den mitgeteilten Aktenangaben erkennen, daß die Erkrankung Anfang 1920 mit Fieber, heftigen Kopfschmerzen, leichter Benommenheit, Lähmung äußerer und innerer Augenmuskeln und Blutüberfüllung am Sehnervenkopf begonnen und sich seitdem dann offenbar sehr schleichend entwickelt hat. Die körperlichen Symptome müssen hier im Anfang, wie im Fall VIII, zunächst nur wenig ausgeprägt gewesen sein. Ist doch das Leiden erst 7 Jahre nach der Infektion in der Kehrer'schen Klinik diagnostiziert worden, und auch da waren die körperlichen Symptome noch

nicht besonders auffallend. Im Vordergrund des Krankheitsbildes stehen im Fall IX ebenfalls wieder Veränderungen mehr seelischer Art. Das zeitweise seltsame Verhalten des Erkrankten, die „Sturmangriffe“, die er in eigenartigen Dämmerzuständen ausführte, zeigten sicherlich hysterische Färbung. Die Anfälle von Bewußtseinsstörungen mit Erregungszuständen sind bei der chronischen epidemischen Encephalitis ziemlich selten. Nach Ansicht der Kehler'schen Klinik, wie sie in einem Gerichtsgutachten zum Ausdruck gebracht wurden, läßt sich in diesem Fall auch vom fachärztlichen Standpunkt aus nicht genau entscheiden, ob die Anfälle hier nicht etwa doch damit zusammenhängen, daß die Encephalitis an einem Gehirn aufgetreten ist, das vielleicht infolge des Schädelschusses an seiner Oberfläche oder an seinen Häuten eine aus sonstigen Symptomen später nicht mehr erschließbare mikroskopische Verletzung erlitten hatte. Diese etwaigen Restfolgen der Schädelverletzung konnten dauernd Kopfschmerzen verursachen und die psychischen Erscheinungen konnten deshalb wohl erklärt werden als hysterische Reaktionen auf plötzlich auftretende Zufälligkeiten von unbestimmtem Unbehagen, Angst oder anfallsweise auftretender Verschlimmerung der Kopfschmerzen. Die Schwindelanfälle bzw. die epileptiformen Anfälle, über die der Patient im Fall 9 klagte, komplizierten weiterhin das Krankheitsbild, sodaß die Diagnosefindung hier also, so lange der körperliche Befund nur geringe Symptome bot, sicherlich nicht leicht war.

Ähnliche Erregungszustände bei der chronischen epidemischen Encephalitis werden übrigens auch von E. Thurzo und Tibor Katona beschrieben. Sie berichten unter anderem über ein 17-jähriges Kind, bei dem unter Fieberanstieg eigenartige Anfälle mit Zwangsschreien auftraten. Das Kind lief dabei aufgeregt im Zimmer umher und zerbrach dabei sogar häufig Gegenstände, die ihm in den Weg kamen. Auch die im Fall 9 bestehenden Schwindelanfälle finden in der Literatur Analogien. So berichtet zum Beispiel C. Römer über 10 Fälle von chronischer epidemischer Encephalitis, in denen die Patienten zunächst in der Hauptsache über plötzlich auftretende Schwindelanfälle klagten.

* * *

Ehe wir uns die Frage vorlegen, worauf das gehäufte Vorkommen von Fehldiagnosen bei der epidemischen Encephalitis zurückzuführen ist, sei zunächst darauf hingewiesen,

daß unser Wissen über das Wesen dieser Krankheit durchaus noch nicht als ein Abgeschlossenes zu bezeichnen ist. Man nimmt im allgemeinen heute wohl als sicher an, daß es sich bei der epidemischen Encephalitis um eine Infektionskrankheit handelt, die in irgendwelchen Beziehungen zur Grippe steht. Ueber ihren Erreger ist das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen. Nach den Angaben Stern's und Stertz's kommt der von Economo und Wiesner aus einem experimentell infizierten Affen gezüchtete *Diplostreptococcus* als Erreger ernstlich wohl nicht in Frage. Von größerer Beweiskraft erscheinen die Ausführungen Stern's. Danach stehen pandemische Grippe und epidemische Encephalitis in einem indirekten Zusammenhang. Das eigentliche Virus der Encephalitis soll eine filtrierbare Noxe sein, die in einer harmlosen Form im Mundschleim vieler Menschen vorkommt. Die Aktivierung dieser harmlosen Noxe soll beim Menschen möglicherweise durch das Grippevirus erfolgen. Das einmal aktivierte Encephalitisvirus soll dann auch vielleicht pathogen wirken können, ohne daß immer eine Grippe mitwirkksam zu sein braucht. Neuerdings wird aber von einer Reihe von französischen Forschern, worauf ich schon bei der Besprechung des Falles 5 hinwies, überhaupt bestritten, daß es sich bei der Encephalitis epidemica um eine epidemische Infektionskrankheit handelt. Es wird wohl noch eine geraume Zeit dauern, bis eine einheitliche Anschauung über das Wesen dieser Krankheit zustande gekommen ist.

Ebenso ist noch nicht genügend geklärt, worauf die Tendenz zum stetigen Fortschreiten des Krankheitsprozesses bei der epidemischen Encephalitis beruht. Nach der Auffassung von Pette handelt es sich dabei nicht um eine immer weiter von außen wirkende Bakterien- oder Toxinschädigung, sondern vielmehr um die Eigenart der Zellen selbst, die, wenn sie einmal erkrankt, bezw. wenn sie einmal schwerer geschädigt sind, nur für begrenzte Zeit noch funktionstüchtig bleiben können, dann aber immer weiter sich erschöpfen und schließlich wie bei der *Paralysis agitans* ganz zugrunde gehen.

Die eigentliche Ursache für das häufige Verkennen der epidemischen Encephalitis dürfte wohl zunächst darin zu suchen sein, daß diese Erkrankung in ihren äußeren Erscheinungen für die Mehrzahl der Aerzte etwas vollkommen Neues darstellte, daß sie ihnen — insbesondere auch aus der Literatur — kaum oder gar überhaupt nicht bekannt war. Die *Paralysis agitans* ist zwar schon vor mehr als 100 Jahren

von Parkinson beschrieben worden. Aber gerade durch die Encephalitis epidemica wurde erst unsere Kenntnis von den extrapyramidalen Erkrankungen wesentlich gefördert; denn erst sie stellte der modernen Wissenschaft ein umfangreiches Beobachtungsmaterial zur Verfügung.

Einer der Hauptgründe für die Fehldiagnose ist ferner darin zu suchen, daß der Arzt zu e n g neurologisch betrachtet. Er prüft das Verhalten der Haut- und Sehnenreflexe, der Pupillen, fahndet nach Pyramidenzeichen und auch wohl nach Störungen des statischen Gleichgewichts. Die psychomotorischen Störungen und die Tonusveränderungen vernachlässigt oder übersieht er dagegen ganz.

Erschwert wird ferner die Erkennung der Krankheit durch die vielgestaltigen Formen, in denen sich die chronische epidemische Encephalitis der Beobachtung darbietet. Hinzu kommt außerdem, daß in einer ganzen Reihe von Fällen, — nach Mitteilungen Sterns bei dem Material der Göttinger Klinik in etwa 7 $\frac{1}{2}$ „ aller Fälle — eine vorausgegangene grippeartige Erkrankung, hinter der eine akute Encephalitis epidemica zu vermuten gewesen wäre, bei der Aufnahme der Vorgeschichte nicht eruiert werden kann, daß das Leiden sich vielmehr, ähnlich wie bei Tabes und anderen „Meta“-Erkrankungen, scheinbar ohne irgendeinen besonderen Anlaß allmählich eingeschlichen hat.

Nach dem Gesagten ist nicht auffällig, daß am häufigsten Verwechslungen mit hysterischen Zustandsbildern vorkommen. Beherrscht der Schütteltremor das Krankheitsbild, so besteht zweifellos die Gefahr der Verwechslung mit einer analogen Manifestation der Hysterie, zumal auch der encephalitische Tremor, worauf Stern besonders hinweist, den Affekten und Suggestionen ebenso unterliegt, wie ein hysterischer Tremor. Die charakteristischen Rigiditätsphänomene können besonders dann, wenn sie nur wenig ausgeprägt sind und insbesondere auch von jemandem, der sie vorher sehr selten oder überhaupt noch nicht beobachtet hat, leicht übersehen oder falsch gedeutet werden. Ferner ist Stern durchaus beizupflichten, wenn er annimmt, daß auch von Fachärzten in vielen Fällen eine psychogene Störung darum diagnostiziert wurde, weil man durch die vielen Tausenden von Kriegshysterikern etwas zu leichtfertig in der Verführung, ungeklärte Erscheinungen als hysterisch zu bezeichnen, geworden war.

Inzwischen ist ja nun die Literatur über die epidemische Encephalitis erheblich angewachsen und die Kenntnis von dem Wesen der Erkrankung wird dadurch in weitere ärztliche Kreise eingedrungen sein und mithelfen, das Vorkommen von Fehldiagnosen zu verringern. Vielleicht lohnt es sich aber auch weiterhin, ähnliche Fehldiagnosen zusammenzustellen und zu veröffentlichen.

Zum Schluß ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Professor Dr. K e h r e r für die Anregung zu der Arbeit und für die lebenswürdige Ueberlassung von Fällen aus eigenem Material auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

Literatur.

1. B e n e d e k, L.: Zwangsmäßiges Schreien in Anfällen als postencephalitische Hyperkinese. — Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 1925, Bd. 98, S. 17—26.
2. v. B r a i l o v s k i und M. T s c h a l i s s o v und M. Berlin: Zur Biologie der Encephalitis epidemica chronica. Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 1926, Bd. 106, Seite 137—154.
3. F a l k i e w i c z, T. und R o t h f e l d, J.: Ueber Zwangsbewegungen bei epidemischer Encephalitis. Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1925, Bd. 85, Seite 269—281.
4. F i l i m o n o f f, J. N.: Motorische Anfälle bei Erkrankungen des extrapyramidalen Systems. — Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 1925, Bd. 97, Seite 504—514.
5. F l e i s c h m a n n, S., K i e w: Ueber die Encephalitis-epidemie in der Ukraine. — Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie. 1923, Seite 299.
6. G e o r g i, F.: Ungewöhnliche postencephalitische Symptomenbilder. — Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 1926, Bd. 106, Seite 602—613.
7. G u r e w i t s c h, M. und R. T k a t s c h e w: Beiträge zur Klinik der chronischen epidemischen Encephalitis.
 1. Extrapyramidale Anfälle.
 2. Extrapyramidaler Mutismus.
 3. Zentrale Parästhesien.
 4. Encephalitis epidemica bei einem Schizophrenen.Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 1925, Bd. 99, Seite 485—503.
8. H e n n e b e r g, R.: Das Parkinson — Syndrom. — Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. 1925, Nr. 11, Seite 329—336.

9. Hofstadt, F.: Beiträge zur Kenntnis der Encephalitis epidemica im Kindesalter. — Zeitschrift für Kinderheilkunde. 1921, Bd. 29, Seite 190–212.
10. Hofstadt, F.: Ueber Spät- und Dauerschäden nach Encephalitis epidemica im Kindesalter. — Zeitschrift für Kinderheilkunde. 1921, Bd. 29, Seite 272–305.
11. Jähnel, F.: Die Aetiologie der epidemischen Encephalitis — Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 1925, Bd. 99, Seite 253–270.
12. Jürgens: Ueber den Charakter der gegenwärtigen Grippeepidemie. — Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. 1924, Nr. 8, Seite 221–223.
13. Kastan: Encephalitis lethargica mit rezidivierenden Herderscheinungen. — Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie. 1923, Seite 334–335.
14. Kretschmer: Ueber Encephalitis und ihre Behandlung. — Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. 1927, Nr. 17, Seite 549–552.
15. Kuhlentkamp, G.: Zwerchfelltremor nach Grippe. — Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1926, Bd. 94, Seite 312–314.
16. Kuttner, Hans Peter: Pathologisch-anatomische Untersuchungen zur Verwandtschaft der menschlichen und tierischen Herpes-, Kling- und Staupe-Encephalitis. — Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 1926, Bd. 105, Seite 182–192.
17. Langen, A.: Mord nach Encephalitis lethargica. Beitrag zur Psychologie der Encephalitiker. — Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 1925, Bd. 95, Seite 506–521.
18. Lossen, J.: Ueber Folgezustände der Encephalitis epidemica. — Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. 1924 Nr. 7, Seite 189–196.
19. Margulis, M. S.: Myelo-Radiculo-Polyneuritiden bei epidemischer Encephalitis. — Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1926, Bd. 89, Seite 262–277.

20. Margulis und Model: Zur Pathologie der assoziierten Bewegungen im Zusammenhang mit vestibulärem Symptomen-Komplex bei Encephalitis. Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1926, Bd. 93, Seite 80–95.
21. Margulis und Model: Ueber abortive Formen der epidemischen Encephalitis. — Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1927, Bd. 99, Seite 193–204.
22. Neustadt, Düsseldorf: Zur Psychopathologie der Encephalitis-Folgezustände. — Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie. 1927, Bd. 86, Seite 442–443.
23. Pette, H.: Klinische und anatomische Betrachtungen zur Pathogenese der Folgezustände nach Encephalitis epidemica. — Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1925, Bd. 87, Seite 60–68.
24. Popowa, Nina: Tonische Krämpfe der Augenmuskulatur bei Encephalitis epidemica. — Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 1925, Bd. 97, Seite 515–523.
25. Rabinowitsch, A.: Ein Fall von Hirntumor unter dem Bilde einer epidemischen Encephalitis. Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1925, Bd. 88, Seite 67–74.
26. Rabinowitsch, A.: Ein Fall von epidemischer Encephalitis mit klinischen Symptomen der Wilson'schen Krankheit. — Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 1925, Bd. 94, Seite 478–482.
27. Reinhold, W.: Ueber die myoklonische Form der Encephalitis. — Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 1925, Bd. 95, Seite 21–36.
28. Rist, Otto: Eigenartige Bewegungsabläufe bei Encephalitikern. — Deutsche Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 1925, Bd. 95, Seite 189–193.
29. Rittershaus, E.: Zur Kasuistik der postencephalitischen Erkrankungen. Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1925, Bd. 85, Seite 249–256.
30. Roos, E.: Ueber Encephalitis epidemica. — Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. 1922, Nr. 4, Seite 105–109.

31. Römer, E.: Ueber eigenartige monosymptomatische Formen der Encephalitis epidemica. — Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1925, Bd. 86, Seite 274—284.
 32. Scharfetter, H.: Zur Symptomatologie des extrapyramidalen Blickkrampfes. — Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1925, Bd. 86, Seite 237—249.
 33. Scharfetter, H.: Zur Kenntnis psychiatrischer Grenzzustände nach Encephalitis epidemica. — Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1926, Bd. 93, Seite 61—79.
 34. Scharnke, A.: Ueber Variationen der Symptomatologie der Encephalitis epidemica. — Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1926, Bd. 95, Seite 118—121.
 35. Sèval, J.: Die sogenannte epidemische Encephalitis. — Die medizinische Welt. 1928, Nr. 24, Seite 904—907.
 36. Stern, F.: Die epidemische Encephalitis, Monographien aus dem Gesamtbiet der Neurologie und Psychiatrie. Heft 30, 1922.
 37. Stern, F.: Dienstbeschädigungsfrage und epidemische Encephalitis. — Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. 1925, Bd. 63, Seite 246—276.
 38. Stern, F.: Differentialdiagnose und Therapie der chronischen Encephalitis. — Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. 1926, Nr. 23, Seite 752—759.
 39. Stertz: Die Erkrankungen des extrapyramidalen Systems. Encephalitis von purulenta. — Lehrbuch der Nervenkrankheiten von Kurschmann und Kramer. 2. Auflage 1925, Seite 540—559 und Seite 503—513.
 40. v. Thurzo, E. und Tibor Katona: Ueber die Benedek'sche Klazomanie und Souquesche Palilalie als postencephalitische Hyperkinesen. — Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1927, Bd. 98, Seite 278—283.
 41. Trunk, H.: Schizophrene Psychosen bei Encephalitis lethargica. — Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 1927, Bd. 109, Seite 495—500.
 42. Zuelzer, G.: Die chronische Influenza. — Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. 1925, Nr. 23, Seite 714—717.
-

Lebenslauf.

Am 3. August 1898 wurde ich zu Gelsenkirchen als Sohn des Bergmanns Ernst Wienold geboren. Von Ostern 1904 bis Ostern 1908 besuchte ich die Volksschule und von Ostern 1908 bis zum Ausbruch des Krieges das Städt. Realgymnasium zu Gelsenkirchen. Von Herbst 1914 bis zum Ende des Krieges war ich Soldat. Nach meiner Heimkehr bestand ich im Februar 1919 am Städt. Realgymnasium in Gelsenkirchen die Reifeprüfung.

Ich studierte dann zunächst im Herbst-Zwischen-Semester 1919 und im Wintersemester 1920 in Münster Chemie. Vom Sommersemester 1920 ab studierte ich in Münster Medizin. Im Herbst 1921 siedelte ich nach Marburg a. L. über und bestand hier im Dezember 1922 die ärztliche Vorprüfung.

Die klinischen Semester studierte ich ebenfalls in Marburg und beendete hier im August 1925 die ärztliche Prüfung.

Das praktische Jahr leistete ich am Marienhospital in Gelsenkirchen ab. Nach meiner Approbation am 15. August 1926 war ich bis Ende Februar 1927 in der Allgemeinpraxis des Leiters der inneren Abteilung des Marienhospital, San.-Rat Dr. Grüttn er, tätig. Seit dem 1. März 1927 bin ich als Arzt am Versorgungsamt Gelsenkirchen-Buer angestellt.
